

Симагель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидное средство. Представляет собой гидратированный алюминия магния силикат. Нейтрализует свободную хлористоводородную кислоту в желудке, снижает кислотность желудочного сока. Предотвращает влияние агрессивных факторов на слизистую оболочку желудка и усиливает ее собственные защитные механизмы. Оказывает также обволакивающее, адсорбирующее и желчегонное действие.

Показания к применению:

Острый гастрит, хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка в фазе обострения, эзофагит, острый дуоденит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; симптоматическая язва ЖКТ различного генеза, эрозия слизистой оболочки ЖКТ, рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, симптомы, обусловленные повышенной кислотностью желудочного сока (изжога, чувство тяжести или переполнения, "голодные" боли в эпигастральной области); острый панкреатит, хронический панкреатит в фазе обострения; броидильная или гнилостная диспепсия (в качестве вспомогательного средства); диспептические симптомы невротического генеза, после погрешностей в диете.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Диспепсия](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Панкреатит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язва](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Хроническая почечная недостаточность, болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия, I триместр беременности, повышенная чувствительность к алмазилату.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально. Частота применения - 4 раза/сут между приемами пищи и перед сном. Длительность курса лечения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки составляет не менее 6 недель.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, диарея, запор.

Со стороны мочевыделительной системы: при длительном приеме в высоких дозах - нефрокальциноз, гиперкальциурия, нарушение функции почек.

Со стороны обмена веществ: при длительном приеме в высоких дозах - гипофосфатемия, гипокальциемия, гипермагниемия, повышение содержания алюминия в крови, остеомаляция, остеопороз.

Со стороны ЦНС: энцефалопатия.

Прочие: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с алмазилатом уменьшается и замедляется абсорбция индометацина, салицилатов, аминазина, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, кетоконазола и итраконазола, изониазида, мексилетина, антибиотиков тетрациклинового ряда, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, азитромицина, цефподоксима, рифампицина, сульфаниламидов, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, зальцитабина, желчных кислот - хенодесоксихолевой и урсодесоксихолевой, пенициллина.

Улучшает всасывание в желудке слабых оснований, в т.ч. пропранолола, триметоприма.

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие алмазилата.

Особые указания и меры предосторожности:

У пациентов с выраженными нарушениями функции почек при длительном применении возможны жажда, отложения алюминия в нервной и костной ткани, развитие гипермагниемии, появление симптомов магниевой интоксикации.

При длительном применении желательна обеспечить дополнительное поступление фосфатов в организм.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: хроническая почечная недостаточность.

У пациентов с выраженными нарушениями функции почек при длительном применении возможны жажда, отложения алюминия в нервной и костной ткани, развитие гипермагниемии, появление симптомов магниевой интоксикации.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Simagel>