

Симетрид



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Суппозитории ректальные** массой от 1.19 г до 1.31 г, светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом ментола, торпедообразной формы.

	1 супп.
флуоцинолона ацетонид	400 мкг
висмута субгаллат (дерматол)	40 мг
ментол рацемический	4 мг
тримекаин	25 мг

Вспомогательные вещества: вода очищенная, витепсол, моноглицериды дистиллированные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения при геморрое. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, подсушивающее, анальгезирующее и противозудное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Симетрид не предоставлены.

Показания к применению:

- геморрой;
- трещины заднего прохода;
- проктит;
- воспаление и зуд в области заднего прохода.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Зуд](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят ректально по 1 суппозиторию в сутки после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника в течение 5 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: жжение, сухость слизистых оболочек (при применении препарата более 5 суток).

Системные побочные реакции, характерные для глюкокортикостероидов (при длительном применении): гастрит, стероидная язва желудка, недостаточность коры надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, стероидный сахарный диабет, замедление репаративных процессов.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Симетрид не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Симетрид не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Simetrid>