Симетрид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные*** массой от 1.19 г до 1.31 г, светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом ментола, торпедообразной формы.

	1 супп.
флуоцинолона ацетонид	400 мкг
висмута субгаллат (дерматол)	40 мг
ментол рацемический	4 мг
тримекаин	25 мг

Вспомогательные вещества: вода очищенная, витепсол, моноглицериды дистиллированные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения при геморрое. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, подсушивающее, анальгезирующее и противозудное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Симетрид не предоставлены.

Показания к применению:

— геморрой;

— трещины заднего прохода;

— проктит;

— воспаление и зуд в области заднего прохода.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Зуд
- Проктит

Противопоказания:

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят ректально по 1 суппозиторию в сутки после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника в течение 5 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: жжение, сухость слизистых оболочек (при применении препарата более 5 суток).

Системные побочные реакции, характерные для глюкокортикостероидов (при длительном применении): гастрит, стероидная язва желудка, недостаточность коры надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, стероидный сахарный диабет, замедление репаративных процессов.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Симетрид не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Симетрид не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Simetrid