Симпатил



Код АТХ:

- N05CM

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** голубого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
сухой экстракт эшшольции	20 мг
сухой экстракт боярышника	75 мг
магния оксид	124.35 мг,
что соответствует содержанию элементарного магния	75 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 122 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 15 мг, стеариновая кислота микронизированная - 3.65 мг.

Состав пленочной оболочки: защитная глазурь - 2 мг (гуммилак - 1.554 мг, повидон - 223 мкг, глицерил моноацетат - 223 мкг); окрашенный порошок - 13 мг (гипромеллоза - 7.15 мг, титана диоксид (Е171) - 3.704 мг, макрогол 6000 - 1.788 мг, индигокармин (Е132) - 344 мкг, азорубин (Е122) - 13 мкг, железа оксид желтый (Е172) - 1 мкг, тальк следы).

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает седативное действие, устраняет состояние тревоги и связанные с ним вегетативные нарушения, тахикардию и нарушения сна.

Биологически активные вещества экстракта боярышника - тритерпеновые соединения и флавоноиды оказывают спазмолитическое действие, избирательно расширяя сосуды сердца и мозга, снижают возбудимость ЦНС и миокарда.

Экстракт эшшольции оказывает анксиолитическое, седативное действие, сокращает время засыпания и улучшает качество сна при легких формах диссомнии. Алкалоиды эшшольции группы протопина увеличивают in vitro связь GABA с чувствительными к ней рецепторами мозга.

Магний улучшает регуляцию трансмембранного обмена ионов натрия и калия, является антагонистом ионов кальция, снижает способность к проведению возбуждения по нейромышечным синапсам, к сокращению гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры; оказывает также нейроседативное, спазмолитическое и анксиолитическое действие.

Фармакокинетика

Магния оксид в желудке превращается в магния хлорид, который абсорбируется в тонком кишечнике с помощью механизма пассивного всасывания, уровень всасывания не превышает 50%. Экскреция магния, в основном, осуществляется с мочой. Действие компонентов затруднено для кинетических наблюдений.

Показания к применению:

— состояния эмоционального напряжения и стресса, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, беспокойством, повышенной раздражительностью, тревогой, страхом, повышенной утомляемостью, сердцебиением;

— нарушения сна (легкой формы).

Противопоказания:

— тяжелая почечная недостаточность (КК ниже 30 мл/мин);

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 2 таб. 2 раза/сут. Таблетки принимают внутрь утром и вечером, до еды, запивая водой.

Продолжительность лечения 3-4 недели. Интервал между курсами лечения 3 недели.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: диарея, боли в эпигастральной области.

Передозировка:

Прием препарата в больших дозах может привести к задержке мочи.

Лечение: регидратация, форсированный диурез. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат Симпатил при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется сочетать препарат Симпатил с лекарственными средствами, содержащими хинидин, т.к. снижается почечная экскреция хинидина в связи с ощелачиванием мочи и возможно развитие передозировки (в связи с повышением концентрации хинидина в плазме крови).

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелой почечной недостаточности (КК ниже 30 мл/мин).

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Simpatil