## Синкаптон



# Код АТХ:

N02CA72

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Эрготамин повышает тонус экстракраниальных сосудов, расширенных во время мигренозной атаки, устраняет головную боль.

Кофеин усиливает всасывание эрготамина в кишечнике и повышает тонус экстракраниальных сосудов.

Дименгидринат подавляет рвотный центр.

Терапевтический эффект развивается через 30 мин и продолжается 3-6 ч.

#### Фармакокинетика

Эрготамин медленно и не полностью всасывается из ЖКТ. При пероральном приеме 2 мг концентрация в плазме - 0.36 нг/мл, одновременный прием кофеина повышает концентрацию в плазме до 0.7 нг/мл.

 $\mathsf{T}_{1/2}$  эрготамина из плазмы - 2 ч. 90% его метаболитов выводятся с желчью.

Кофеин быстро всасывается при пероральном приеме, время достижения  $C_{\text{max}}$  - 1 ч,  $T_{1/2}$  - 3-7 ч. Выводится с мочой в виде метаболитов.

Дименгидринат хорошо всасывается при пероральном приеме,  $T_{1/2}$  - 5-8 ч. Метаболизируется в печени, выводится с мочой в виде метаболитов.

#### Показания к применению:

— мигрень (купирование приступа).

#### Относится к болезням:

Мигрень

беременность;

— период лактации.

### Противопоказания:

— гиперчувствительность;
— нарушение периферического кровообращения;
— облитерирующий эндартериит;
— заболевания коронарных сосудов;
— эпилепсия;
— глаукома;
— гипертрофия предстательной железы;
— бронхиальная астма;
— ИБС;
— детский возраст (до 6 лет);

# Способ применения и дозы:

Внутрь, запивая большим количеством воды. Для **детей старше 12 лет** и **взрослых**: при первых признаках мигрени - по 1 таб. Если улучшение не наступает, то принимают еще 1 таб. через 30 мин. Прием препарата можно повторять через каждые 30 мин до достижения максимальной суточной дозы - 4 таб. При установленной ранее индивидуальной суточной дозе она может быть назначена в один прием при появлении признаков мигрени.

Недельный прием не должен превышать 10 таб.

Для **детей от 6 до 12 лет**: 1/2 таб.

### Побочное действие:

Сонливость, повышенная утомляемость, запор, аллергические реакции, мидриаз, периферическая вазоконстрикция, ощущение холода в конечностях, парестезии, боль за грудиной.

### Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, тахикардия, кожный зуд, потеря чувствительности, боль в конечностях (ишемия), головокружение, угнетение дыхания.

*Лечение:* промывание желудка раствором натрия сульфата, прием активированного угля, контроль АД и ЧСС, ингаляция кислорода, при артериоспазме - в/в вазодилататоры.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием с седативными и снотворными лекарственными средствами усиливает эффективность.

Тролеандомицин, макролиды, бета-адреноблокаторы - усиление вазоконстрикции.

Синкаптон снижает эффективность гепарина, фенотиазина.

Дименгидринат может маскировать ототоксичность аминогликозидов.

# Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен иметь препарат постоянно при себе, особенно в ситуациях, провоцирующих мигренозный приступ: менструация, колебания погоды, напряжение зрения, прием пероральных контрацептивов, продуктов (кофе, сыр, шоколад). Важно успеть принять препарат в продромальной фазе, а не после развившейся мигренозной атаки.

Применяется только для купирования мигренозного приступа, а не для длительного лечения. После недельного применения препарата необходимо сделать перерыв. Если мигренозные приступы частые, то необходимо согласовывать кратность приема препарата с лечащим врачом.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 6 лет).

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Sinkapton