Синупрет



Код АТХ:

- R07AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже***, покрытые оболочкой зеленого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 драже
порошок корня горечавки (Gentiana lutea)	6 мг
порошок цветков первоцвета (Primula veris)	18 мг
порошок травы щавеля (Rumex acetosa)	18 мг
порошок цветков бузины (Sambucus nigra)	18 мг
порошок травы вербены (Verbena officinalis)	18 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, вода очищенная, лактозы моногидрат, желатин, сорбитол, стеариновая кислота.

Состав оболочки: кальция карбонат, глюкозы сироп, лак зеленый Е104, Е132, лак желто-зеленый Е104, Е132, магния оксид, крахмал кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, натрия карбонат безводный, метилметакрилата, диметиламиноэтил метакрилата и бутилметакрилата сополимер, повидон К25, касторовое масло, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид.

25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◊ ***Капли для приема внутрь*** желто-коричневого цвета, прозрачные, с ароматным запахом; возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка.

	100 г
водно-спиртовой экстракт*	29 г
* для приготовления 100 г водно-спиртового экстракта используется:	
корень горечавки (Gentiana lutea)	200 мг
цветки первоцвета (Primula veris)	600 мг
трава щавеля (Rumex acetosa)	600 мг

цветки бузины (Sambucus nigra)	600 мг
трава вербены (Verbena officinalis)	600 мг

Вспомогательные вещества: этанол 16.0-19.0 об.%, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Оказывает секретолитическое, секретомоторное и противовоспалительное действие. Восстанавливает защитные свойства и уменьшает отек слизистой оболочки дыхательных путей. Способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательных путей.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Синупрет не предоставлены.

Показания к применению:

— острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

Относится к болезням:

- Синусит

Противопоказания:

— алкоголизм (для капель для приема внутрь);

— непереносимость лактозы (для драже);

— детский возраст до 2 лет (для капель для приема внутрь);

— детский возраст до 6 лет (для драже);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат в форме капель для приема внутрь не рекомендуется назначать после успешного лечения хронического алкоголизма.

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени, эпилепсии, заболеваниях и травмах головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально в зависимости от возраста.

Возраст	Разовая доза	Кратность приема
Взрослые	2 драже или 50 капель	3 раза/сут
Дети в возрасте от 6 до 16 лет	1 драже или 25 капель	3 раза/сут
Дети в возрасте от 2 до 6 лет	15 капель	3 раза/сут

Курс лечения составляет 7-14 дней. Пациент должен быть проинформирован о том, что если симптомы заболевания сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, необходимо проконсультироваться с врачом.

Драже проглатывают целиком, не разжевывая, и запивают небольшим количеством воды. Капли принимают внутрь, предварительно разводят в небольшом количестве воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - боли в верхней части живота, тошнота.

Аллергические реакции: кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка.

Передозировка:

Возможно усиление выраженности побочного действия.

При применении препарата в форме капель для приема внутрь в дозах, значительно превышающих терапевтические, возможно отравление этанолом. При приеме содержимого флакона (100 мл) в организм попадает 16 г этанола.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Синупрета при беременности возможно только по назначению врача. Принимать капли для приема внутрь, вследствие содержания алкоголя, следует только в том случае, если невозможен прием драже.

Препарат Синупрет не рекомендуется к применению в период грудного вскармливания в связи с отсутствием опыта его клинического применения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестно.

Особые указания и меры предосторожности:

Капли для приема внутрь содержат 16.0-19.0% этанола (в объемном отношении).

При использовании капель для приема внутрь флакон следует держать в вертикальном положении.

При хранении капель для приема внутрь возможно легкое помутнение и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет на активность препарата.

Перед употреблением флакон следует взбалтывать.

При применении препарата в форме драже у больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что усваиваемые углеводы, содержащиеся в 1 драже, составляют менее 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан **детям до 2 лет** (для капель для приема внутрь);

Противопоказан **детям до 6 лет** (для драже);

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

После вскрытия флакона капли для приема внутрь следует использовать в течение 6 мес.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sinupret