

Синупрет



Код АТХ:

- [R07AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Драже**, покрытые оболочкой зеленого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 драже
порошок корня горечавки (<i>Gentiana lutea</i>)	6 мг
порошок цветков первоцвета (<i>Primula veris</i>)	18 мг
порошок травы щавеля (<i>Rumex acetosa</i>)	18 мг
порошок цветков бузины (<i>Sambucus nigra</i>)	18 мг
порошок травы вербены (<i>Verbena officinalis</i>)	18 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, вода очищенная, лактозы моногидрат, желатин, сорбитол, стеариновая кислота.

Состав оболочки: кальция карбонат, глюкозы сироп, лак зеленый E104, E132, лак желто-зеленый E104, E132, магния оксид, крахмал кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, натрия карбонат безводный, метилметакрилата, диметиламиноэтил метакрилата и бутилметакрилата сополимер, повидон K25, касторовое масло, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид.

25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◇ **Капли для приема внутрь** желто-коричневого цвета, прозрачные, с ароматным запахом; возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка.

	100 г
водно-спиртовой экстракт*	29 г
* для приготовления 100 г водно-спиртового экстракта используется:	
корень горечавки (<i>Gentiana lutea</i>)	200 мг
цветки первоцвета (<i>Primula veris</i>)	600 мг
трава щавеля (<i>Rumex acetosa</i>)	600 мг

Синупрет

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цветки бузины (<i>Sambucus nigra</i>)	600 мг
Трава вербены (<i>Verbena officinalis</i>)	600 мг

Вспомогательные вещества: этанол 16.0-19.0 об.%, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Оказывает секретолитическое, секретомоторное и противовоспалительное действие. Восстанавливает защитные свойства и уменьшает отек слизистой оболочки дыхательных путей. Способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательных путей.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Синупрет не предоставлены.

Показания к применению:

— острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

Относится к болезням:

- [Синусит](#)

Противопоказания:

- алкоголизм (для капель для приема внутрь);
- непереносимость лактозы (для драже);
- детский возраст до 2 лет (для капель для приема внутрь);
- детский возраст до 6 лет (для драже);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат в форме капель для приема внутрь не рекомендуется назначать после успешного лечения хронического алкоголизма.

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени, эпилепсии, заболеваниях и травмах головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально в зависимости от возраста.

Возраст	Разовая доза	Кратность приема
Взрослые	2 драже или 50 капель	3 раза/сут
Дети в возрасте от 6 до 16 лет	1 драже или 25 капель	3 раза/сут
Дети в возрасте от 2 до 6 лет	15 капель	3 раза/сут

Курс лечения составляет 7-14 дней. Пациент должен быть проинформирован о том, что если симптомы заболевания сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, необходимо проконсультироваться с врачом.

Драже проглатывают целиком, не разжевывая, и запивают небольшим количеством воды. Капли принимают внутрь, предварительно разводят в небольшом количестве воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - боли в верхней части живота, тошнота.

Аллергические реакции: кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка.

Передозировка:

Возможно усиление выраженности побочного действия.

При применении препарата в форме капель для приема внутрь в дозах, значительно превышающих терапевтические, возможно отравление этанолом. При приеме содержимого флакона (100 мл) в организм попадает 16 г этанола.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Синупрета при беременности возможно только по назначению врача. Принимать капли для приема внутрь, вследствие содержания алкоголя, следует только в том случае, если невозможен прием драже.

Препарат Синупрет не рекомендуется к применению в период грудного вскармливания в связи с отсутствием опыта его клинического применения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестно.

Особые указания и меры предосторожности:

Капли для приема внутрь содержат 16.0-19.0% этанола (в объемном отношении).

При использовании капель для приема внутрь флакон следует держать в вертикальном положении.

При хранении капель для приема внутрь возможно легкое помутнение и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет на активность препарата.

Перед употреблением флакон следует взбалтывать.

При применении препарата в форме драже у больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что усваиваемые углеводы, содержащиеся в 1 драже, составляют менее 0.03 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

Препарат в форме капель для приема внутрь следует назначать с *осторожностью* при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан **детям до 2 лет** (для капель для приема внутрь);

Противопоказан **детям до 6 лет** (для драже);

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

После вскрытия флакона капли для приема внутрь следует использовать в течение 6 мес.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sinupret>