

## Скандонест



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Местноанестезирующее средство, механизм действия которого связан со стабилизацией клеточных мембран. Вызывает все виды местной анестезии: терминальную, инфильтрационную, проводниковую. Оказывает быстрое и сильное действие.

### **Показания к применению:**

Для местной анестезии при различных терапевтических и хирургических вмешательствах в полости рта (смазывание слизистых оболочек при интубации трахеи, бронхоэзофагоскопии, тонзиллэктомии; в стоматологии).

### **Относится к болезням:**

- [Анестезия](#)
- [Бронхит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Трахеит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к местноанестезирующим средствам амидного типа и к алкил-4-гидроксибензоатам (парабенам).

### **Способ применения и дозы:**

Количество раствора и общая доза зависят от вида анестезии и характера оперативного вмешательства или манипуляций. Средняя разовая доза - 1.3 мл; при необходимости доза может быть увеличена.

*Максимальные суточные дозы:* для взрослых и детей с массой тела более 30 кг - 5.4 мл; для детей с массой тела 20-30 кг - 3.6 мл; для детей с массой тела менее 20 кг - 1.8 мл.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* (особенно при превышении дозы или при случайном внутрисосудистом введении) эйфория, депрессия, нарушения речи, глотания, зрения, судороги, угнетение дыхания, кома, брадикардия, артериальная гипотензия; аллергические реакции (крапивница, отек Квинке).

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности применение мепивакаина возможно только по строгим показаниям.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении мепивакаина с бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и другими противоаритмическими средствами усиливается угнетающее действие на проводимость и сократимость миокарда.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста.

### ***Применение в пожилом возрасте***

С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Skandonest>