

Скин-кап



Код АТХ:

- [D11AX12](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиритион цинка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль для наружного применения 0.2%** в виде маслянистого раствора от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, с характерным запахом.

	1 г
Цинк пиритион активированный	2 мг

Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, этанол, пропелленты (изобутан, пропан, бутан).

70 г - баллоны алюминиевые аэрозольные (1) с распылительной головкой и специальной насадкой для обработки волосистой части головы - пачки картонные.

◇ **Крем 0.2% для наружного применения** белого цвета с характерным запахом.

	1 г
Цинк пиритион активированный	2 мг

Вспомогательные вещества: Тего Кэр 450 (дистеарат полиглицерил 3-метил глюкозы), Тегин М (глицерил стеарат), Тего Алканол 18 (стеариловый спирт), Тегософт ЕЕ (октил октаноат), Тегософт Р (изопропил пальмитат), Тегософт ЛСЕ 65К (кокоат сукрозы), Абил К4 (циклометикон), глицерол, Тегософт Е20 (метил глюкоцет 20), нипагин, ароматизатор (Бинеа Д 10680), бутилгидрокситолуен, вода очищенная.

50 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

◇ **Шампунь 1%** в виде суспензии белого цвета с характерным запахом.

	1 мл
Цинк пиритион активированный	10 мг

Вспомогательные вещества: сополимер натрия лаурилсульфата, амид-коко-N (гидроксиэтил), алкиламидобетаин жирных кислот, натрия лаурилсульфат, диметикон, сополимер полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля и 55-пропиленгликоля олеата, ментол, натрия хлорид, трилон Б, вода очищенная.

5 г - саше (5) - коробки картонные.

150 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Цинк пиритион активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при заболеваниях кожи. Антибактериальная *активность* проявляется в отношении ряда патогенных микроорганизмов *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*

Цинк пиритион снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

При наружном применении цинк пиритион депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция происходит медленно. Обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению:

Шампунь:

- псориаз;
- атопический дерматит волосистой части головы;
- себорейный дерматит;
- зуд;
- перхоть;
- жирная себорея;
- сухая себорея.

Крем и аэрозоль для наружного применения (для взрослых и детей старше 1 года):

- псориаз;
- атопический дерматит (экзема, нейродермит);
- себорейный дерматит;
- сухость кожи (только для крема).

Относится к болезням:

- [Атопический дерматоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Скин-кап

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат применяют наружно.

Перед применением **шампуня** интенсивно встряхнуть флакон. Нанести небольшое количество шампуня Скин-кап на влажные волосы и помассировать кожу головы. Промыть и нанести шампунь повторно. Оставить шампунь на волосах в течение 5 мин, затем тщательно промыть большим количеством воды. Препарат применяют 2-3 раза в неделю в течение первых 2 недель. Курс лечения при *псориазе* составляет 5 недель, при *себорее* - 2 недели. В период ремиссии шампунь можно использовать 1-2 раза в неделю в качестве средства профилактики рецидивов.

Крем для наружного применения после интенсивного встряхивания наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут. Курс лечения при *псориазе* составляет 1-1.5 мес, при *атопическом дерматите* - 3-4 недели.

Аэрозоль для наружного применения распыляют в достаточном количестве на пораженные участки кожи с расстояния около 15 см. Применяют 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов. Перед применением баллон сильно встряхнуть несколько раз. Во время распыления баллон следует держать вертикально. Для обработки аэрозодем волосистой части головы прилагается специальная насадка.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Скин-кап не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Исследования по безопасности применения препарата Скин-кап при беременности и в период лактации не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Скин-кап с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Шампунь Скин-кап не влияет на естественный цвет и состояние волос.

Условия хранения:

Препарат в форме шампуня и аэрозоля для наружного применения следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4° до 30°С.

Препарат в форме крема для наружного применения следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4° до 20°С. Срок годности - 3 года.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Skin-кап>

