Скиноклир (крем)



Код АТХ:

- D10AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Азелаиновая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Крем для наружного применения*** белого цвета.

	100 г
азелаиновая кислота	20 мг

Вспомогательные вещества: бензойная кислота - 0.2 г, глицерил стеарат и макрогола-30 стеарат - 5 г, глицерил - стеарат и цетостеариловый спирт и цетилпальмитат и глицериды жирных кислот кокосового масла - 7 г, цетеарил этилгексаноат - 3 г, пропиленгликоль - 12.5 г, глицерол (глицерин) - 1.5 г, вода очищенная - до 100 г.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
15 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
20 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
25 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
30 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
50 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения угрей. Обладает противомикробной активностью в отношении Propionibacterium acne и Staphylococcus epidermidis. Наряду с этим уменьшает содержание свободных жирных кислот в липидах кожи, а также нормализует нарушенные процессы кератинизации в фолликулах сальных желез.

Фармакокинетика

После нанесения на кожу азелаиновая кислота проникает в эпидермис и дерму. Часть всосавшейся азелаиновой кислоты выводится почками в неизмененном виде, а часть в виде дикарбоновых кислот (С5, С7), образующихся из азелаиновой кислоты в результате бета-окисления.

Показания к применению:

Acne vulgaris, себорейный дерматит, патологическая гиперпигментация (в т.ч. мелазма).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Себорея

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к азелаиновой кислоте.

Способ применения и дозы:

Дозу и длительность лечения устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности по показаниям.

Учитывая низкую системную биодоступность и низкую токсичность азелаиновой кислоты возможно применение в период лактации (грудного вскармливания).

В *экспериментальных исследованиях* на лабораторных животных не было выявлено отрицательного влияния азелаиновой кислоты на репродуктивную функцию, не установлено эмбриотоксического и тератогенного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания на слизистые оболочки и в глаза.

Источник: http://drugs.thead.ru/Skinoklir_krem