Слабикап



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натрия пикосульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной, слегка вязкой, бесцветной или слабо окрашенной жидкости.

	1 мл (15 капель)
натрия пикосульфат	7.5 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, пропиленгликоль, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
15 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительный препарат, стимулирующий перистальтику кишечника. Активная форма препарата, образующаяся путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, в результате чего ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды.

Действие наступает через 10-12 ч после приема.

Фармакокинетика

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания к применению:

— атонический запор;

— регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);

— подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Запор
- Проктит

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— ущемленная грыжа;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— перитонит;

— абдоминальные боли неясного генеза;

— кровотечения из ЖКТ;

— метроррагия;

— цистит;

— тяжелая дегидратация;

— спастический запор;

— детский возраст до 4 лет;

— беременность (I триместр);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат в период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, перед сном.

Для **взрослых** начальная доза составляет 10 капель, при *стойком запоре* - до 30 капель. Для **детей старше 4 лет** начальная доза - 5-8 капель. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Не следует применять препарат ежедневно более 10 дней без врачебного контроля.

Побочное действие:

Возможны: диарея, абдоминальные боли, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов. Кроме того, при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.

Лечение: промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, назначают спазмолитические средства.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

С осторожностью следует назначать препарат в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

ГКС и диуретики при одновременном применении со Слабикапом увеличивают риск развития электролитных нарушений.

Антибиотики широкого спектра действия снижают слабительное действие Слабикапа.

Особые указания и меры предосторожности:

У детей следует применять только по назначению врача.

Не обладает вкусовыми качествами, поэтому детям можно добавлять в пищу.

Применение в детском возрасте

Для **детей старше 4 лет** начальная доза - 5-8 капель. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Условия хранения:

Препарат следует хранить защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Slabikap