

[Слабикап](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия пикосульфат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной, слегка вязкой, бесцветной или слабо окрашенной жидкости.

	1 мл (15 капель)
натрия пикосульфат	7.5 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, пропиленгликоль, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

15 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительный препарат, стимулирующий перистальтику кишечника. Активная форма препарата, образующаяся путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, в результате чего ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды.

Действие наступает через 10-12 ч после приема.

Фармакокинетика

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания к применению:

- атонический запор;
- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- абдоминальные боли неясного генеза;
- кровотечения из ЖКТ;
- метроррагия;
- цистит;
- тяжелая дегидратация;
- спастический запор;
- детский возраст до 4 лет;
- беременность (I триместр);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат в период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, перед сном.

Для **взрослых** начальная доза составляет 10 капель, при *стойком запоре* - до 30 капель. Для **детей старше 4 лет** начальная доза - 5-8 капель. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Не следует применять препарат ежедневно более 10 дней без врачебного контроля.

Побочное действие:

Возможны: диарея, абдоминальные боли, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов. Кроме того, при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.

Лечение: промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, назначают спазмолитические средства.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Слабикап

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат противопоказан при беременности.

С осторожностью следует назначать препарат в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

ГКС и диуретики при одновременном применении со Слабикапом увеличивают риск развития электролитных нарушений.

Антибиотики широкого спектра действия снижают слабительное действие Слабикапа.

Особые указания и меры предосторожности:

У детей следует применять только по назначению врача.

Не обладает вкусовыми качествами, поэтому детям можно добавлять в пищу.

Применение в детском возрасте

Для **детей старше 4 лет** начальная доза - 5-8 капель. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Условия хранения:

Препарат следует хранить защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Slabikap>