

[Слабительный сбор №1](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Крапивы двудомной листья](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Тысячелистника обыкновенного трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает слабительное действие.

Показания к применению:

— запоры.

Относится к болезням:

- [Запор](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- синдром "острого" живота;
- кишечная непроходимость;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- кровотечения из ЖКТ;
- спастический запор;

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Сырье измельченное: для приготовления отвара около 6 г (1 ст.ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до первоначального объема 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного извлечения доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

Перед применением готовый отвар или водное извлечение из фильтр-пакетов рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Жажда, головная боль, кардиалгия, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Передозировка:

Симптомы: кишечная колика, диарея, гипокалиемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Настой можно хранить в прохладном месте не более 48 ч.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Slabitelnyy_Sbor_no1