Слабительный сбор №1



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Крапивы двудомной листья
- Крушины ольховидной кора
- Тысячелистника обыкновенного трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает слабительное действие.

Показания к применению:

— запоры.

Относится к болезням:

- Запор

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— синдром "острого" живота;

— кишечная непроходимость;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— кровотечения из ЖКТ;

— спастический запор;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Сырье измельченное: для приготовления отвара около 6 г (1 ст.ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до первоначального объема 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного извлечения доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

Перед применением готовый отвар или водное извлечение из фильтр-пакетов рекомедуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Жажда, головная боль, кардиалгия, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Передозировка:

Симптомы: кишечная колика, диарея, гипокалиемия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Настой можно хранить в прохладном месте не более 48 ч.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Slabitelnyy_sbor_no1