

## [Слабительный сбор №1](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Крапивы двудомной листья](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Тысячелистника обыкновенного трава](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает слабительное действие.

### **Показания к применению:**

— запоры.

### **Относится к болезням:**

- [Запор](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- синдром "острого" живота;
- кишечная непроходимость;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- кровотечения из ЖКТ;
- спастический запор;

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет).

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь.

**Сырье измельченное:** для приготовления отвара около 6 г (1 ст.ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до первоначального объема 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

**Фильтр-пакеты:** 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного извлечения доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают по 1/2-1 стакану на ночь.

Перед применением готовый отвар или водное извлечение из фильтр-пакетов рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции.

Жажда, головная боль, кардиалгия, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* кишечная колика, диарея, гипокалиемия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказания: беременность; период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Настой можно хранить в прохладном месте не более 48 ч.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Slabitelnyy\\_sbor\\_no1](http://drugs.thead.ru/Slabitelnyy_sbor_no1)