

[Слипекс](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Спрей для местного применения** в виде прозрачной, бесцветной или с желтоватым оттенком жидкости, с мятно-ментоловым запахом.

	1 мл
масло мяты перечной	2.5 мг
эвкалиптол	400 мкг
ментол	100 мкг
метилсалицилат	100 мкг

Вспомогательные вещества: глицерол, цетилпиридиния хлорид, масло мяты колосковой, пропиленгликоль, натрия сахарин, полисорбат 80, вода очищенная.

60 мл - флаконы полипропиленовые (1) с распылителем - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике.

Смесь эфирных масел с метилсалицилатом оказывает местное тонизирующее, противовоспалительное и антисептическое действие при обработке слизистой оболочки глотки.

Метилсалицилат стимулирует и тонизирует дряблые мышцы мягкого неба и языка, предотвращая их втягивание и обладает местным противовоспалительным эффектом.

Масло мяты перечной и эвкалиптол рефлекторным путем за счет раздражения рецепторов слизистых оболочек обладают умеренным местным анальгезирующим и антисептическим действием.

Ментол обладает местным анальгезирующим и антисептическим действием.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Слипекс не предоставлены.

Показания к применению:

— для предотвращения или уменьшения интенсивности проявлений храпа (у взрослых);

— в составе комплексной терапии обострений воспалительных процессов в глотке (тонзиллитов, фарингитов).

Относится к болезням:

- [Тонзиллит](#)
- [Храп](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется местно. Перед использованием следует снять с распылителя защитный колпачок. Распылять препарат следует непосредственно на заднюю стенку глотки и язычок двумя нажатиями. Для достижения наилучшего результата следует воздерживаться от приема еды и питья за 30 мин до и в течение 30 мин после использования препарата.

При *храпе* препарат назначают 1 раз/сут перед сном. Курс лечения - 4 недели.

При *обострении тонзиллита, фарингита* - 3 раза/сут в течение 10 дней.

Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно возникновение аллергических реакций.

Передозировка:

При длительном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться головная боль, тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о влиянии препарата на фармакодинамику и фармакокинетику других лекарственных средств отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Препарат не предназначен для лечения апноэ (остановки дыхания) во время сна.

Отсутствие уменьшения симптомов храпа после применения может свидетельствовать о наличии органической патологии носоглотки (искривление носовой перегородки, аденоидов) или других невыявленных заболеваний, требующих консультации профильного специалиста и специализированной комплексной терапии.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Slipeks>