Смекта



Код АТХ:

- A07BC05

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Смектит диоктаэдрический

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый), в пакетиках по 3,76 г, в пачке картонной 10 или 30 шт.

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ванильный), в пакетиках по 3,76 г, в пачке картонной 10 или 30 шт.

Состав:

1 пакетик порошка (апельсиновый) содержит

Активное вещество: смектит диоктаэдрический 3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат, натрия сахаринат, апельсиновый ароматизатор, ванильный ароматизатор.

1 пакетик порошка (ванильный) содержит

Активное вещество: смектит диоктаэдрический 3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат, натрия сахаринат, ванилин.

Описание:

Порошок от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета с запахом от слабого неспецифического до слабого ванильного.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат природного происхождения, оказывает адсорбирующее действие. Стабилизирует слизистый барьер, образует поливалентные связи с гликопротеидами слизи, увеличивает количество слизи, улучшает ее гастропротективные свойства (в отношении отрицательного действия ионов водорода соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов). Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоиднокристаллической структурой; адсорбирует находящиеся в просвете ЖКТ бактерии, вирусы. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Фармакокинетика

Не абсорбируется, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Для взрослых и детей (включая младенцев):

— острая и хроническая диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение режима питания и качественного состава пищи), диарея инфекционного генеза (в составе комплексной терапии);

— симптоматическое лечение изжоги, вздутия, дискомфорта в животе и других симптомов диспепсии, сопровождающих заболевания органов ЖКТ.

Относится к болезням:

- Вздутие живота
- Диарея
- Диспепсия
- Изжога

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— гиперчувствительность;

— кишечная непроходимость;

— непереносимость фруктозы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— сахаразо-изомальтазная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, при эзофагите — после еды, при других показаниях — между приемами пищи.

Взрослым — 3 пакетика в сутки.

Детям, включая младенцев в возрасте:

до 1 года — 1 пакетик в сутки;

1–2 года — 1–2 пакетика в сутки;

старше 2 лет — 2–3 пакетика в сутки.

Рекомендуемый курс лечения — 3–7 дней.

Для детей содержимое пакетиков растворяют в детской бутылочке (50 мл) и распределяют на несколько приемов в течение дня или перемешивают с каким-либо полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

Для взрослых содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня.

Побочное действие:

В клинических исследованиях сообщалось о редких случаях запора. Во всех случаях это явление было слабо выражено и проходило после индивидуального изменения режима дозирования.

В рутинной практике в очень редких случаях сообщалось о реакциях гиперчувствительности (в т.ч. крапивница, сыпь, зуд или отек Квинке).

Передозировка:

Передозировка может вызвать выраженный запор.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Смекта® разрешена к применению у беременных и кормящих женщин. Коррекции дозировки и режима приема не требуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат может уменьшать скорость и степень всасывания одновременно принимаемых лекарственных средств. Не рекомендуется принимать Смекту® одновременно с другими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Рекомендуется соблюдать интервал 1–2 ч между приемом Смекты® и других лекарственных средств.

С осторожностью применять у пациентов с тяжелыми хроническими запорами в анамнезе.

У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с мерами по регидратации. При необходимости взрослым также может быть назначена терапия препаратом в комплексе с мерами по регидратации.

Комплекс мер по регидратации назначается в зависимости от течения заболевания, возраста и особенностей пациента.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Smekta