## Смекта



# Код АТХ:

• A07BC05

# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Смектит диоктаэдрический

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия  $\frac{MHH}{MHD}$  PJC VIDAL Mail.Ru Drugs.com  $\frac{MHH}{MHD}$ 

# Форма выпуска:

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый), в пакетиках по 3,76 г, в пачке картонной 10 или 30 шт.

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ванильный), в пакетиках по 3,76 г, в пачке картонной 10 или 30 шт.

#### Состав:

#### 1 пакетик порошка (апельсиновый) содержит

Активное вещество: смектит диоктаэдрический 3 г

*Вспомогательные вещества:* декстрозы моногидрат, натрия сахаринат, апельсиновый ароматизатор, ванильный ароматизатор.

#### 1 пакетик порошка (ванильный) содержит

Активное вещество: смектит диоктаэдрический 3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат, натрия сахаринат, ванилин.

#### Описание:

Порошок от серовато-белого до светлого серовато-желтого цвета с запахом от слабого неспецифического до слабого ванильного.

## Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат природного происхождения, оказывает адсорбирующее действие. Стабилизирует слизистый барьер, образует поливалентные связи с гликопротеидами слизи, увеличивает количество слизи, улучшает ее гастропротективные свойства (в отношении отрицательного действия ионов водорода соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов). Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоиднокристаллической структурой; адсорбирует находящиеся в просвете ЖКТ бактерии, вирусы. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

#### Фармакокинетика

Не абсорбируется, выводится в неизменном виде.

# Показания к применению:

Для взрослых и детей (включая младенцев):

- острая и хроническая диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение режима питания и качественного состава пищи), диарея инфекционного генеза (в составе комплексной терапии);
- симптоматическое лечение изжоги, вздутия, дискомфорта в животе и других симптомов диспепсии, сопровождающих заболевания органов ЖКТ.

#### Относится к болезням:

- Вздутие живота
- Диарея
- Диспепсия
- Изжога

#### Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- гиперчувствительность;
- кишечная непроходимость;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- сахаразо-изомальтазная недостаточность.

#### Способ применения и дозы:

Внутрь, при эзофагите — после еды, при других показаниях — между приемами пищи.

Взрослым — 3 пакетика в сутки.

Детям, включая младенцев в возрасте:

до 1 года — 1 пакетик в сутки;

1-2 года — 1-2 пакетика в сутки;

старше 2 лет — 2-3 пакетика в сутки.

Рекомендуемый курс лечения — 3-7 дней.

Для детей содержимое пакетиков растворяют в детской бутылочке (50 мл) и распределяют на несколько приемов в течение дня или перемешивают с каким-либо полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

Для взрослых содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня.

# Побочное действие:

В клинических исследованиях сообщалось о редких случаях запора. Во всех случаях это явление было слабо выражено и проходило после индивидуального изменения режима дозирования.

В рутинной практике в очень редких случаях сообщалось о реакциях гиперчувствительности (в т.ч. крапивница, сыпь, зуд или отек Квинке).

### Передозировка:

Передозировка может вызвать выраженный запор.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Смекта $^{(8)}$  разрешена к применению у беременных и кормящих женщин. Коррекции дозировки и режима приема не требуется.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат может уменьшать скорость и степень всасывания одновременно принимаемых лекарственных средств. Не рекомендуется принимать Смекту<sup>®</sup> одновременно с другими препаратами.

# Особые указания и меры предосторожности:

Рекомендуется соблюдать интервал 1–2 ч между приемом Смекты $^{8}$  и других лекарственных средств.

С осторожностью применять у пациентов с тяжелыми хроническими запорами в анамнезе.

У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с мерами по регидратации. При необходимости взрослым также может быть назначена терапия препаратом в комплексе с мерами по регидратации.

Комплекс мер по регидратации назначается в зависимости от течения заболевания, возраста и особенностей пациента.

#### Условия хранения:

При температуре не выше 25 °C.

## Срок годности:

3 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Smekta