# Снуп

## Код АТХ:

- R01AA07

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ксилометазолин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный 0.05%*** в виде бесцветного прозрачного раствора.

| | **1 мл** |
|---|---|
| ксилометазолина гидрохлорид | 500 мкг |

*Вспомогательные вещества:* вода морская - 250 мг, калия дигидрофосфат - 450 мкг, вода очищенная - 754.35 мг.

15 мл (150 доз) - флаконы полиэтиленовые (1) с распылительным клапаном (3К система) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный 0.1%*** в виде бесцветного прозрачного раствора.

| | **1 мл** |
|---|---|
| ксилометазолина гидрохлорид | 1 мг |

*Вспомогательные вещества:* вода морская - 250 мг, калия дигидрофосфат - 450 мкг, вода очищенная - 753.85 мг.

15 мл (150 доз) - флаконы полиэтиленовые (1) с распылительным клапаном (3К система) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Сосудосуживающее средство с альфа-адреномиметической активностью для местного применения в ЛОР-практике.

Ксилометазолин вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя отек и гиперемию слизистой оболочки носа, восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание.

Действие препарата наступает через несколько минут после его применения и продолжается в течение нескольких часов.

***Фармакокинетика***

При местном применении препарат практически не всасывается, поэтому его концентрация в плазме крови очень мала (современными аналитическими методами не определяется).

## Показания к применению:

— острые респираторные заболевания с явлениями ринита;

— острый аллергический ринит;

— поллиноз;

— синусит;

— евстахиит;

— средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки);

— облегчение проведения риноскопии и других диагностических манипуляций в носовых ходах.

## Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Евстахиит
- Острые респираторные заболевания
- Отит
- Поллиноз
- Ринит
- Синусит

## Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— тахикардия;

— выраженный атеросклероз;

— глаукома;

— атрофический ринит;

— тиреотоксикоз;

— хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);

— беременность;

— детский возраст до 2 лет (для 0.05% раствора);

— детский возраст до 6 лет (для 0.1% раствора);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при ИБС (стенокардия), гиперплазии предстательной железы, тиреотоксикозе, сахарном диабете, в период лактации.

## Способ применения и дозы:

**Детям в возрасте от 2 до 6 лет** назначают по 1 впрыскиванию Снуп спрея назального 0.05% в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить) до 3 раз/сут.

**Взрослым и детям в возрасте от 6 лет** назначают по 1 впрыскиванию Снуп спрея назального 0.1% в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить) до 3 раз/сут.

Препарат не следует применять чаще 3 раз/сут. Продолжительность курса лечения - не более 5-7 дней.

## Побочное действие:

*Со стороны дыхательной системы:* при частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, чиханье, гиперсекреция; редко - отек слизистой оболочки полости носа.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* редко - головная боль, бессонница, нарушение зрения, депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - ощущение сердцебиения, тахикардия, аритмии, повышение АД.

*Со стороны ЖКТ:* редко - рвота.

## Передозировка:

*Симптомы:* усиление побочных эффектов.

*Лечение:* симптоматическое, под наблюдением врача.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности.

С осторожностью следует применять препарат в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат несовместим с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

## Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата следует очистить носовые ходы.

Не следует применять препарат в течение длительного времени (например, при хроническом рините).

***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 6 лет (для 0.1% раствора). У детей в возрасте до 2 лет следует применять только 0.05% раствор препарата.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Содержимое флакона стерильно, без консервантов.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 3 месяцев.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Snup