

## Софтовак



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<i>Порошок для приема внутрь</i>	<b>100 г</b>
сухой экстракт листьев подорожника овального	40 г
сухой экстракт листьев сенны индийской	15 г
сухой экстракт плодов миробалана чебуля	10 г
сухой экстракт плодов кассии трубчатой	10 г
сухой экстракт корней солодки голой	5 г
сухой экстракт плодов шиповника	5 г
сухой экстракт плодов фенхеля обыкновенного	5 г
масло фенхеля	1 г

100 г - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное средство. Оказывает слабительное действие. Усиливает перистальтику толстой кишки, нормализует консистенцию стула. Обладает противовоспалительным, желчегонным и ветрогонным действием.

### Показания к применению:

- запор;
- регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

### Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

### Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- боли в животе неясного генеза;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания брюшной полости;
- перитонит;
- желудочно-кишечные и маточные кровотечения;
- цистит;
- нарушения водно-электролитного обмена;
- беременность;
- лактация;
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* назначают при заболеваниях печени и/или почек, при состояниях после полостных операций.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь. По 1-2 чайные ложки (5-10 г), запивая теплой водой или соком, либо разведя в 1/2 стакана теплой воды, 1 раз/сут на ночь.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции. После приема препарата моча может приобретать желто-коричневый или красно-сиреневый цвет.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При длительном применении в высоких дозах возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, ГКС, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Нарушает абсорбцию тетрациклинов.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.

При длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны потеря с катом электролитов, в основном калия, альбуминурия, гематурия, тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание мочи, кожная сыпь, утомляемость.

#### **При нарушениях функции почек**

С *осторожностью* назначают при заболеваниях почек.

#### **При нарушениях функции печени**

## **Софтовак**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

С *осторожностью* назначают при заболеваниях печени.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте.

### **Условия хранения:**

Хранить препарат при температуре не выше 30°C, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Softovak>