

Солкотриховак



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения в виде пористой таблетки белого цвета.

	1 фл. (1 доза)
селекционные инактивированные лиофилизированные лактобациллы (коккоидные формы) 8 штаммов в эквивалентном количестве: <i>L.rhamnosus</i> (3 штамма), <i>L.vaginalis</i> (3 штамма), <i>L.fermentum</i> (1 штамм), <i>L.salivarius</i> (1 штамм)	не менее 7×10^9

Вспомогательные вещества: фенол (200 мкг), реполимеризированный желатин (гемацель) (5 мг), натрия хлорид (4.5 мг).

Растворитель: вода д/и - 0.5 мл.

Флаконы (1) в комплекте с растворителем (амп.) - пачки картонные.

Флаконы (3) в комплекте с растворителем (амп.) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вакцина, регулирующая равновесие микрофлоры влагалища, для системного применения. Введение вакцины приводит к активации специфического и неспецифического иммунитета.

Под действием препарата происходит повышение уровня гуморальных антител класса IgG в ответ на введение поверхностных антигенов атипичных лактобактерий, содержащихся в препарате, а также повышение общего содержания sIgA и повышение уровня специфических sIgA-антител в секрете влагалища. Несмотря на то, что спустя некоторое время после введения препарата содержание специфических sIgA-антител снижается до исходного уровня, сохраняется защитный эффект препарата, снижающий риск развития реинфекции.

В экспериментальных исследованиях *in vitro* и *in vivo* было показано, что Солкотриховак активизирует поликлональные В-лимфоциты, а также стимулирует образование неспецифических антител класса IgA. В экспериментах *in vitro* было обнаружено повышение фагоцитарной активности макрофагов, на фоне вакцинации Солкотриховакком животных отмечено значительное кратковременное повышение цитотоксической активности собственных Т-киллеров.

Выработка специфических и неспецифических антител на фоне вакцинации Солкотриховакком способствует элиминации атипичных форм лактобактерий, трихомонад и неспецифических патогенных бактерий, способствует росту палочек Дедерлейна, восстановлению нормальной микрофлоры и нормализации физиологического значения pH слизистой влагалища.

Вакцинация Солкотриховаком уменьшает риск возникновения рецидива инфекции и повторного заражения, вызванного трихомонадой и другими патогенными бактериями, у 80% пациенток с рецидивирующими вагинальными инфекциями.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Солкотриховак не проводились.

Показания к применению:

Профилактика и лечение:

- рецидивирующего неспецифического бактериального вагиноза;
- рецидивирующего трихомониаза у женщин.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Трихомониаз](#)

Противопоказания:

- острые инфекционные заболевания;
- активный туберкулез;
- заболевания системы кроветворения (в т.ч. острый лейкоз);
- почечная недостаточность;
- сердечная недостаточность;
- первичные и вторичные иммунодефицитные состояния;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м (в ягодичную мышцу). Курс вакцинации состоит из 3 инъекций препарата по 0.5 мл каждая (содержимое одного флакона) с интервалами в 2 недели. Через год проводится однократная ревакцинация в дозе 0.5 мл.

В дальнейшем проводится однократная ревакцинация каждые 2 года.

Для приготовления вакцины необходимо ввести стерильный растворитель (0.5 мл воды для инъекций) во флакон, содержащий лиофилизированный порошок. Растворение лиофилизата происходит в течение 30 сек с образованием однородной полупрозрачной беловатой суспензии без видимых посторонних частиц. Приготовленную суспензию используют немедленно. Перед забором суспензии в шприц флакон с растворенным лиофилизатом следует встряхнуть.

Не следует применять препарат при наличии трещины на флаконе с лиофилизатом или на ампуле с растворителем, нечеткой маркировке, неразбивающихся комков в растворенном препарате.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - слабовыраженные эритема, отечность и боль в месте инъекции.

Системные реакции: в отдельных случаях - кратковременное повышение температуры тела (до 40°C), озноб, головная боль, утомляемость.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Солкотриховак не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Солкотриховак не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации, поскольку в настоящее время отсутствуют клинические данные о применении препарата у этой категории пациенток.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На фоне применения иммунодепрессантов или проведения лучевой терапии возможно ослабление действия Солкотриховака.

Случаев несовместимости при одновременном применении препарата Солкотриховак с другими лекарственными средствами не отмечено.

Фармацевтическое взаимодействие

Не рекомендуют смешивать в одном шприце Солкотриховак и другие лекарственные средства для парентерального применения (в т.ч. вакцины).

Особые указания и меры предосторожности:

Солкотриховак не следует назначать при венерических заболеваниях (гонорея, сифилис).

В случае острого течения трихомониоза или выраженных симптомов бактериального вагиноза вакцинацию Солкотриховаком следует проводить только в комбинации с этиотропным лечением.

Время вакцинации следует рассчитать таким образом, чтобы введение препарата не совпадало с менструацией пациентки.

Аллергические реакции при использовании препарата не наблюдались. В случае их появления или развития других серьезных реакций применение препарата следует прекратить.

О всех случаях поствакцинальных осложнений необходимо сообщить в местный отдел здравоохранения, Государственный институт стандартизации и контроля медицинских иммунобиологических препаратов им. Л.А.Тарасевича (119002, Москва, Сивцев Вражек, 41) и в представительство компании Валеант Фармасьютикалс Швейцария ГмБХ.

Использование в педиатрии

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 15 лет**, т.к. в настоящее время отсутствуют данные о клинических испытаниях препарата у детей.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к работе с механизмами и вождению автотранспорта.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 15 лет**, т.к. в настоящее время отсутствуют данные о клинических испытаниях препарата у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С (термоконтейнеры).

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Solkotrihovak>