# <u>Солпадеин</u>



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кодеин
- Кофеин
- Парацетамол

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр МНН МНН ВИКИПЕДИЯ МНН МНН МНН РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com НТЛ

# Форма выпуска:

**Таблетки** белого цвета, капсуловидные, удлиненной формы, с маркировкой красного цвета "Solpadeine" на одной стороне.

e ropone.		
	1 таб.	
парацетамол	500 мг	
кодеина фосфата гемигидрат	8 мг	
кофеин	В0 мг	

Вспомогательные вещества: крахмал растворимый, крахмал кукурузный, повидон, калия сорбат, целлюлоза микрокристаллическая, тальк очищенный, стеариновая кислота, магния стеарат, этанол 95%, вода деминерализованная, гидроксипропилметилцеллюлоза, кармазин (E122).

- 5 шт. блистеры (1) пачки-обложки пластиковые.
- 5 шт. блистеры (2) пачки-обложки пластиковые.
- 6 шт. блистеры (1) пачки-обложки пластиковые.
- 6 шт. блистеры (2) пачки-обложки пластиковые.
- 8 шт. блистеры (1) пачки-обложки пластиковые.
- 8 шт. блистеры (1) коробки картонные.
- 12 шт. блистеры (1) коробки картонные.

Таблетки растворимые белого цвета, плоские, с фаской, гладкие с одной стороны и с риской — с другой.

	1 таб.
парацетамол	500 мг
кодеина фосфата гемигидрат	8 мг
кофеин	30 мг

Вспомогательные вещества: натрия бикарбонат, сорбитол, натрия сахарин, натрия лаурилсульфат, лимонная кислота безводная, натрия карбонат безводный, поливидон, диметикон.

- 2 шт. стрипы (2) коробки картонные.
- 2 шт. стрипы (4) коробки картонные.
- 2 шт. стрипы (6) коробки картонные.
- 2 шт. стрипы (12) коробки картонные.
- 2 шт. стрипы (30) коробки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Анальгетик-антипиретик комбинированного состава, содержит комбинацию трех активных ингредиентов.

Парацетамол оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие.

Кофеин оказывает общетонизирующее действие (уменьшает сонливость и чувство усталости, повышает умственную и физическую работоспособность, увеличивает ЧСС, повышает АД при артериальной гипотензии), усиливает обезболивающее действие препарата.

Кодеин оказывает анальгезирующее действие и улучшает переносимость боли.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Солпадеин не предоставлены.

# Показания к применению:

ьолевои синдром у взрослых и детеи старше 12 лет, в т.ч.:
— головная боль;
— зубная боль;
— мигрень;
— боли в мышцах и суставах;
— невралгия;
— болезненные менструации;
— боль при радикулите и растяжениях;
— боли при синуситах;
— боль в горле.

Для снижения повышенной температуры тела у взрослых и детей старше 12 лет при простудных, других инфекционно-воспалительных заболеваниях и гриппе.

#### Относится к болезням:

- Головная боль
- Грипп
- Зубная боль
- Инфекции
- Мигрень
- Невралгия
- Неврит
- РадикулитРастяжение
- Синусит

## Противопоказания:

- выраженные нарушения функции печени или почек;
- заболевания крови (тромбоцитопения, анемия);
- генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- глаукома;
- дыхательная недостаточность, состояния после черепно-мозговой травмы, повышенное внутричерепное давление;

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

- артериальная гипертензия;
- одновременный прием других парацетамолсодержащих средств;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 12 лет);
- повышенная индивидуальная чувствительность к парацетамолу, кодеину, кофеину или любому другому ингредиенту препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при синдроме Жильбера (конституциональная гипербилирубинемия), врожденной гипербилирубинемии (Дубина-Джонсона и Ротора), бронхиальной астме, а также в пожилом возрасте.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 16 лет** назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут с интервалами не менее 4 ч. Максимальная разовая доза составляет 2 таб., максимальная суточная доза - 8 таб.

**Детям в возрасте от 12 до 16 лет** назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут с интервалами не менее 4 ч. Максимальная разовая доза 1 таб., максимальная суточная доза - 4 таб.

Препарат применяют внутрь после еды. Таблетки растворимые перед приемом следует растворить в половине стакана воды.

Препарат не следует принимать более чем 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и более 3 дней в качестве жаропонижающего. Изменение дозы и интервала между приемами устанавливает врач.

## Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в эпигастрии; редко - запор.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке.

Со стороны системы кроветворения: очень редко - анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия.

Со стороны ЦНС: редко - нарушение сна, сонливость, головокружение.

Прочие: редко - учащенное сердцебиение.

При длительном применении в дозах, значительно превышающих рекомендованные, повышается вероятность нарушения функции печени и почек.

#### Передозировка:

В случае передозировки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, даже при хорошем самочувствии.

Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия; при легкой интоксикации - звон в ушах; при тяжелой интоксикации - спутанное сознание, сонливость, коллапс, судороги, бронхоспазм, затрудненное дыхание.

*Лечение*: сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь), проводить симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При приеме в течение длительного времени Солпадеин усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (варфарин и другие кумарины), что увеличивает риск развития кровотечений.

Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, дифенин, этанол, барбитураты, карбамазепин, флумецинол, рифампицин, зидовудин, фенилбутазон и трициклические антидепрессанты) увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, что обусловливает возможность развития тяжелой интоксикации при незначительном превышении дозы.

Ингибиторы микросомального окисления (в т.ч. циметидин) снижают риск гепатотоксического действия парацетамола.

Метоклопрамид и домперидон увеличивают, а колестирамин снижает скорость всасывания парацетамола.

Солпадеин при одновременном применении снижает эффективность урикозурических препаратов.

Кофеин ускоряет всасывание эрготамина.

Кодеин усиливает действие снотворных, анальгетиков и седативных средств.

Этанол увеличивает  $T_{1/2}$  парацетамола, повышая риск гепатотоксического действия.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать Солпадеин при бронхиальной астме или другом заболевании дыхательной системы, при одновременном приеме антидепрессантов, противорвотных препаратов, а также гиполипидемических препаратов.

Во время приема препарата не рекомендуется избыточное употребление чая и кофе, т.к. это может привести к возбуждению, нарушению сна, тахикардии, сердечной аритмии.

При длительном применении в дозах, значительно превышающих рекомендованные, необходим контроль картины периферической крови.

Во избежание токсического поражения печени пациентам, принимающим Солпадеин, следует воздерживаться от употребления алкоголя. Не рекомендуется назначать препарат при хроническом алкоголизме.

Поскольку в состав препарата входит кодеин, следует иметь в виду возможность развития привыкания.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Солпадеин может вызывать сонливость. В этом случае при приеме Солпадеина следует воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

#### При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте (до 12 лет).

Детям в возрасте от 12 до 16 лет назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут с интервалами не менее 4 ч. Максимальная разовая доза 1 таб., максимальная суточная доза - 4 таб.

Детям старше 16 лет назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут с интервалами не менее 4 ч. Максимальная разовая доза составляет 2 таб., максимальная суточная доза - 8 таб.

#### Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности таблеток растворимых - 4 года, таблеток - 5 лет.

# Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Solpadein