

## Солпадеин Фаст



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кофеин](#)
- [Парацетамол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ **Таблетки растворимые** белого цвета, плоские, с обрезанным по окружности краем и риской на одной стороне.

	<b>1 таб.</b>
парацетамол	500 мг
кофеин	65 мг

*Вспомогательные вещества:* сорбитол, натрия сахаринат, натрия гидрокарбонат, повидон, натрия лаурилсульфат, диметикон, лимонная кислота, натрия карбонат.

- 2 шт. - стрипы ламинированные (6) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы ламинированные (6) - пачки картонные.
- 2 шт. - стрипы ламинированные (12) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Анальгетик-антипиретик комбинированного состава, содержит комбинацию двух активных ингредиентов: парацетамола и кофеина. Оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие.

*Парацетамол* блокирует циклооксигеназу в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции (в воспаленных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на ЦОГ), что объясняет практически полное отсутствие противовоспалительного эффекта. Отсутствие влияния на синтез простагландинов в периферических тканях обуславливает отсутствие у него отрицательного влияния на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды)

и слизистую ЖКТ.

*Кофеин* стимулирует психомоторные центры головного мозга, оказывает аналептическое действие, усиливает эффект анальгетиков, устраняет сонливость и чувство усталости, повышает физическую и умственную работоспособность.

**Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Солпадеин Фаст не предоставлены.

**Показания к применению:**

- головная боль;
- мигрень;
- зубная боль;
- невралгия;
- мышечная и ревматическая боль;
- болезненные менструации;
- боль в горле;
- для снижения повышенной температуры тела и симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа.

**Относится к болезням:**

- [Головная боль](#)
- [Грипп](#)
- [Зубная боль](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Ревматизм](#)

**Противопоказания:**

- выраженные нарушения функции печени или почек;
- артериальная гипертензия;
- глаукома;
- нарушения сна;
- эпилепсия;
- одновременный прием с другими парацетамолсодержащими препаратами;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при доброкачественных гипербилирубинемиях (в т.ч. синдром Жильбера), вирусном гепатите, алкогольном поражении печени, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизме, беременности, в период лактации.

**Способ применения и дозы:**

Таблетки Солпадеин Фаст перед приемом внутрь следует растворить не менее чем в 100 мл (полстакана) воды.

**Взрослым (включая пожилых) и детям старше 12 лет** назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут, если необходимо. Интервал между приемами не менее 4 ч. Максимальная разовая доза - 2 таб., максимальная суточная доза - 8 таб.

Препарат не рекомендуется применять более 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и более 3 дней в качестве жаропонижающего без назначения и наблюдения врача.

Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* сыпь, зуд, отек Квинке.

*Со стороны пищеварительной системы:* диспептические расстройства (в т.ч. тошнота, эпигастральная боль).

*Со стороны системы кроветворения:* редко – лейкопения, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, агранулоцитоз, гемолитическая анемия.

*Прочие:* нарушение сна, тахикардия.

В рекомендованных дозах препарат обычно хорошо переносится. При длительном применении в высоких дозах повышается вероятность гепатотоксического действия, нефротоксического действия и панцитопении.

## **Передозировка:**

В случае передозировки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, даже при хорошем самочувствии.

*Симптомы* передозировки парацетамола: тошнота, рвота, боли в желудке, бледность кожных покровов, анорексия. Через 1-2 сут определяются признаки поражения печени. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность и коматозное состояние.

*Лечение:* сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь), проводить симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью следует назначать препарат при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При приеме в течение длительного времени препарат усиливает действие непрямых антикоагулянтов (варфарин и другие кумарины), что увеличивает риск кровотечений.

Усиливает действие ингибиторов MAO.

Барбитураты, фенитоин, этанол, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты и другие индукторы микросомального окисления увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, обуславливая возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках.

Ингибиторы микросомального окисления (циметидин) снижают риск гепатотоксического действия.

Под воздействием парацетамола  $T_{1/2}$  хлорамфеникола увеличивается в 5 раз.

Кофеин ускоряет всасывание эрготамина.

Одновременный прием парацетамола и этанола повышает риск развития гепатотоксических эффектов и острого панкреатита.

Метоклопрамид и домперидон увеличивают, а колестирамин снижает скорость всасывания парацетамола.

Препарат может снижать эффективность урикозурических препаратов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

## **Солпадеин Фаст**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Во время приема препарата не рекомендуется избыточное употребление чая и кофе, т.к. это может привести к возбуждению, нарушению сна, тахикардии, сердечной аритмии.

В случаях длительного применения в высоких дозах необходим контроль картины крови.

Во избежание токсического поражения печени пациентам, принимающим Солпадеин Фаст, следует воздерживаться от употребления алкоголя. Не рекомендуется назначать препарат при хроническом алкоголизме.

У больных с atopической бронхиальной астмой, поллинозами имеется повышенный риск развития аллергических реакций.

Пациентам, соблюдающим бессолевую или низкосолевую диету, при расчете суточного потребления соли следует учитывать содержание натрия в таблетке (427 мг).

При проведении анализов на определение мочевой кислоты и уровня глюкозы в крови следует сообщить врачу о приеме препарата.

Солпадеин Фаст может изменить результаты анализов допинг-контроля спортсменов.

Препарат с осторожностью следует применять при непереносимости фруктозы, поскольку препарат содержит сорбитол.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

С *осторожностью* следует применять препарат при вирусном гепатите, алкогольном поражении печени.

Во избежание токсического поражения печени пациентам, принимающим Солпадеин Фаст, следует воздерживаться от употребления алкоголя. Не рекомендуется назначать препарат при хроническом алкоголизме.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Solpadein\\_Fast](http://drugs.thead.ru/Solpadein_Fast)