# Солувит Н



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины парентеральное введение

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*** в виде спрессованного порошка желтого цвета.

| | **1 фл.** |
|---|---|
| натрия аскорбат | 113 мг, |
| что соответствует содержанию аскорбиновой кислоты (вит. С) | 100 мг |
| тиамина мононитрат | 3.1 мг, |
| что соответствует содержанию тиамина (вит. $B_1$) | 2.5 мг |
| рибофлавина натрия фосфата дигидрат | 4.9 мг, |
| что соответствует содержанию рибофлавина (вит. $B_2$) | 3.6 мг |
| натрия пантотенат | 16.5 мг, |
| что соответствует содержанию пантотеновой кислоты (вит. $B_5$) | 15 мг |
| пиридоксина гидрохлорид | 4.9 мг, |
| что соответствует содержанию пиридоксина (вит. $B_6$) | 4 мг |
| фолиевая кислота (вит. $B_c$) | 400 мкг |
| цианокобаламин (вит. $B_{12}$) | 5 мкг |
| никотинамид (вит. РР) | 40 мг |
| биотин (вит. Н) | 60 мкг |

*Вспомогательные вещества:* глицин, динатрия эдетат, метилпарагидроксибензоат.

Флаконы бесцветного стекла объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Солувит Н - лиофилизированный стерильный порошок, содержащий водорастворимые витамины. Применяется вместе с инфузионными растворами для внутривенного введения и обеспечивает суточную потребность в водорастворимых витаминах у детей и взрослых.

## Показания к применению:

— как составная часть полного парентерального питания для удовлетворения суточной потребности в водорастворимых витаминах у детей и взрослых.

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата в анамнезе.

## Способ применения и дозы:

Солувит Н необходимо растворять в асептических условиях непосредственно перед использованием.

**Взрослые и дети старше 11 лет**

Содержимое одного флакона в асептических условиях растворяют в 10 мл одного из следующих растворов:

1. Виталипид Н взрослый

2. Интралипид (10% или 20%)

3. Вода для инъекций

4. Растворы глюкозы (5%, 10%, 20%)

Содержимое флакона после растворения в 10 мл Виталипида или Интралипида в асептических условиях добавляют к жировой эмульсии (например, Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический). Раствор, полученный при растворении Солувита Н в 10 мл воды для инъекций или раствора глюкозы, в асептических условиях добавляют к растворам глюкозы (5%, 10%, 20%), жировой эмульсии (например, Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (например, Кабивен центральный или Кабивен периферический).

Содержимое одного флакона удовлетворяет суточную потребность в витаминах. Взрослые и дети старше 11 лет должны получать 1 флакон в сутки.

**Дети младше 11 лет**

Содержимое одного флакона в асептических условиях растворяют, добавив 10 мл одного из следующих растворов:

1. Виталипид Н Детский

2. Интралипид (10% или 20%)

3. Вода для инъекций

4. Растворы глюкозы (5%, 10%, 20%)

Содержимое флакона после растворения в 10 мл Виталипида или Интралипида в асептических условиях добавляют к жировой эмульсии (Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический).

Раствор, полученный при растворении Солувита Н в 10 воды для инъекций или раствора глюкозы, в асептических условиях добавляют к растворам глюкозы (5%, 10%, 20%), жировой эмульсии (Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический).

**Дети с массой тела менее 10 кг:** при добавлении 10 мл совместимого раствора во флакон с Солувитом Н, дневную потребность в водорастворимых витаминах обеспечивает 1 мл полученного раствора на 1 кг массы тела. **Новорожденные и дети с массой тела менее 10 кг** должны получать 1/10 содержимого флакона (1 мл полученного раствора) на 1 кг массы тела в сутки.

## Побочное действие:

На фоне инфузии Солувита Н могут наблюдаться аллергические реакции у пациентов с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата в анамнезе, например, к тиамину или метилпарагидроксибензоату.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пиридоксин (витамин $B_6$) может уменьшать эффект леводопы.

Фолиевая кислота может снижать концентрацию фенитоина в сыворотке крови. Кроме того, введение фолиевой кислоты в больших дозах может затруднить диагностику пернициозной анемии.

## Особые указания и меры предосторожности:

Солувит Н необходимо растворять непосредственно перед использованием.

Готовый раствор Солувита Н должен в асептических условиях добавляться к инфузионному раствору сразу перед началом инфузии и использоваться в течение 24 ч.

При разведении Солувита Н в водных растворах смесь необходимо защищать от света. При разведении Солувита Н в Интралипиде в этом нет необходимости, т. к. жировая эмульсия обладает светозащитными свойствами.

## Условия хранения:

Хранить в защищенном от света, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 30 месяцев.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Soluvit_N