Солувит Н

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины парентеральное введение

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в виде спрессованного порошка желтого цвета.

	1 фл.
натрия аскорбат	113 мг,
что соответствует содержанию аскорбиновой кислоты (вит. С)	100 мг
тиамина мононитрат	3.1 мг,
что соответствует содержанию тиамина (вит. B_1)	2.5 мг
рибофлавина натрия фосфата дигидрат	4.9 мг,
что соответствует содержанию рибофлавина (вит. B_2)	3.6 мг
натрия пантотенат	16.5 мг,
что соответствует содержанию пантотеновой кислоты (вит. B_5)	15 мг
пиридоксина гидрохлорид	4.9 мг,
что соответствует содержанию пиридоксина (вит. B_6)	4 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	400 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	5 мкг
никотинамид (вит. PP)	40 мг
биотин (вит. H)	60 мкг

Вспомогательные вещества: глицин, динатрия эдетат, метилпарагидроксибензоат.

Флаконы бесцветного стекла объемом 10 мл (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Солувит Н - лиофилизированный стерильный порошок, содержащий водорастворимые витамины. Применяется вместе с инфузионными растворами для внутривенного введения и обеспечивает суточную потребность в водорастворимых витаминах у детей и взрослых.

Показания к применению:

— как составная часть полного парентерального питания для удовлетворения суточной потребности в водорастворимых витаминах у детей и взрослых.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Солувит Н необходимо растворять в асептических условиях непосредственно перед использованием.

Взрослые и дети старше 11 лет

Содержимое одного флакона в асептических условиях растворяют в 10 мл одного из следующих растворов:

1. Виталипид Н взрослый

2. Интралипид (10% или 20%)

3. Вода для инъекций

4. Растворы глюкозы (5%, 10%, 20%)

Содержимое флакона после растворения в 10 мл Виталипида или Интралипида в асептических условиях добавляют к жировой эмульсии (например, Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический). Раствор, полученный при растворении Солувита Н в 10 мл воды для инъекций или раствора глюкозы, в асептических условиях добавляют к растворам глюкозы (5%, 10%, 20%), жировой эмульсии (например, Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (например, Кабивен центральный или Кабивен периферический).

Содержимое одного флакона удовлетворяет суточную потребность в витаминах. Взрослые и дети старше 11 лет должны получать 1 флакон в сутки.

Дети младше 11 лет

Содержимое одного флакона в асептических условиях растворяют, добавив 10 мл одного из следующих растворов:

1. Виталипид Н Детский

2. Интралипид (10% или 20%)

3. Вода для инъекций

4. Растворы глюкозы (5%, 10%, 20%)

Содержимое флакона после растворения в 10 мл Виталипида или Интралипида в асептических условиях добавляют к жировой эмульсии (Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический).

Раствор, полученный при растворении Солувита Н в 10 воды для инъекций или раствора глюкозы, в асептических условиях добавляют к растворам глюкозы (5%, 10%, 20%), жировой эмульсии (Интралипид), или в систему для парентерального питания "три в одном" (Кабивен центральный и периферический).

Дети с массой тела менее 10 кг: при добавлении 10 мл совместимого раствора во флакон с Солувитом Н, дневную потребность в водорастворимых витаминах обеспечивает 1 мл полученного раствора на 1 кг массы тела. **Новорожденные и дети с массой тела менее 10 кг** должны получать 1/10 содержимого флакона (1 мл полученного раствора) на 1 кг массы тела в сутки.

Побочное действие:

На фоне инфузии Солувита Н могут наблюдаться аллергические реакции у пациентов с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата в анамнезе, например, к тиамину или метилпарагидроксибензоату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пиридоксин (витамин B_6) может уменьшать эффект леводопы.

Фолиевая кислота может снижать концентрацию фенитоина в сыворотке крови. Кроме того, введение фолиевой кислоты в больших дозах может затруднить диагностику пернициозной анемии.

Особые указания и меры предосторожности:

Солувит Н необходимо растворять непосредственно перед использованием.

Готовый раствор Солувита Н должен в асептических условиях добавляться к инфузионному раствору сразу перед началом инфузии и использоваться в течение 24 ч.

При разведении Солувита Н в водных растворах смесь необходимо защищать от света. При разведении Солувита Н в Интралипиде в этом нет необходимости, т. к. жировая эмульсия обладает светозащитными свойствами.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 30 месяцев.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Soluvit_N