

[Сорбекс](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Активированный уголь](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Адсорбирующее средство. Обладает большой поверхностной активностью и высокой сорбционной способностью. Уменьшает всасывание из ЖКТ токсических веществ, солей тяжелых металлов, алкалоидов и гликозидов, лекарственных веществ, способствуя их выведению из организма. Адсорбирует на своей поверхности газы.

Показания к применению:

Диспепсия, интоксикация при дизентерии, сальмонеллезе, пищевой токсикоинфекции, метеоризм, гиперсекреция соляной кислоты в желудке, аллергические заболевания, отравления химическими соединениями, лекарственными препаратами (в т.ч. алкалоидами, солями тяжелых металлов); для уменьшения газообразования при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Дизентерия](#)
- [Интоксикация](#)
- [Метеоризм](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

Язвенные поражения ЖКТ, кровотечения из ЖКТ.

Способ применения и дозы:

Внутри по 250-750 мг 3-4 раза/сут. При использовании в качестве антидота - режим дозирования индивидуальный.

Побочное действие:

Возможно: запор, диарея; при длительном применении - гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уголь активированный обладает адсорбирующими свойствами и при одновременном приеме в высокой дозе с другими лекарственными препаратами способен существенно снижать их абсорбцию из ЖКТ, что приводит к уменьшению эффективности других лекарственных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

После приема угля активированного кал окрашивается в черный цвет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sorbeks>