Спаскупрель

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтыми, желтовато-коричневыми или черными вкраплениями; запах практически отсутствует.

	1 таб.
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D4	30 мг
Ammonium bromatum (аммониум броматум) D4	30 мг
Atropinum sulfuricum (атропинум сульфурикум) D6	30 мг
Veratrum album (вератрум альбум) D6	30 мг
Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D6	30 мг
Gelsemium sempervirens (гельземиум семпервиренс) D6	30 мг
Passiflora incarnata (пассифлора инкарната) D2	15 мг
Agaricus muscarius (агарикус мускариус) D4	15 мг
Chamomilla recutita (хамомилла рекутита) D3	15 мг
Cuprum sulfuricum (купрум сульфурикум) D6	15 мг
Aconitum napellus (аконитум напеллюс) D6	15 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей);

— спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).

Относится к болезням:

- Болевой синдром
- Спазмы

Противопоказания:

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таб. 3 раза/сут рассасывать под языком за 30 мин до еды или через 1 ч после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таб. каждые 15 мин на протяжении не более 2 ч.

Курс терапии - 2-3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена.

Применение препарата у **детей от 3 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Указание для больных с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у**детей от 3 лет** возможно по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Spaskuprel