

## Спазмалин



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метамизол натрия](#)
- [Питофенон](#)
- [Фенпивериния бромид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки** круглые, плоские, белого или желтовато-белого цвета, с разделительной линией на одной стороне.

	<b>1 таб.</b>
метамизол натрий	500 мг
питофенона гидрохлорид	5 мг
фенпивериния бромид	100 мкг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмала гликолат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

**Раствор для инъекций** прозрачный, от светло-желтого до желтого цвета.

	<b>1 мл</b>	<b>1 амп.</b>
метамизол натрий	500 мг	2.5 г
питофенона гидрохлорид	2 мг	10 мг
фенпивериния бромид	20 мкг	100 мкг

*Вспомогательные вещества:* лимонной кислоты моногидрат, вода д/и.

5 мл - ампулы темного стекла (5) - блистеры (5) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Комбинированный спазмоанальгетик.

Метамизол натрия, производное пиразолона, является анальгетиком-антипиретиком с выраженным анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием, механизм которого связан с угнетением синтеза простагландинов.

Питофенон - миотропный спазмолитик, оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру внутренних органов и вызывает ее расслабление.

Фенпивериния бромид - м-холиноблокатор, оказывает дополнительное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру.

**Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Спазмалин не предоставлены.

**Показания к применению:**

Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов:

- почечная колика;
- желчная колика;
- альгодисменорея.

Кратковременная симптоматическая терапия при:

- артралгии;
- невралгии;
- ишиалгии;
- миалгии.

Для уменьшения болей после хирургических и диагностических вмешательств (в качестве вспомогательного средства).

Спазмалин в форме таблеток применяют при головной боли и мигрени.

**Относится к болезням:**

- [Альгодисменорея](#)
- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Желчная колика](#)
- [Ишиалгия](#)
- [Миалгия](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Почечная колика](#)
- [Спазмы](#)

**Противопоказания:**

- гранулоцитопения,
- заболевания системы кроветворения;
- выраженные нарушения функции печени;
- выраженные нарушения функции почек;
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

## Спазмалин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- тахикардии;
- острая перемежающаяся порфирия;
- закрытоугольная глаукома;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
- кишечная непроходимость;
- мегаколон;
- коллаптоидные состояния;
- I триместр и последние 6 недель беременности;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 3 месяцев (или масса тела менее 5 кг);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата, к производным пиразолона (например к бутадииону), к НПВС и анальгетикам-антипиретикам.

С *осторожностью* и под контролем врача следует применять препарат при нарушениях функцией печени или почек, при склонности к артериальной гипотензии, бронхоспазму. Вопрос о назначении препарата детям и подросткам до 15 лет следует решать индивидуально.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и подросткам старше 15 лет** внутрь препарат назначают обычно по 1-2 таб. 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза - 6 таб. Продолжительность приема не более 5 дней. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под врачебным контролем.

**Детям** препарат назначают по строгим показаниям; дозу препарата устанавливают в зависимости от возраста: в **возрасте 6-8 лет** рекомендуемая разовая доза составляет 1/2 таб., **9-12 лет** - 3/4 таб., **13-15 лет** - 1 таб. Кратность приема - 2-3 раза/сут.

Таблетки следует принимать после еды.

Парентеральное введение обычно используется в экстренных случаях (почечная или желчная колика) и в тех случаях, когда прием внутрь невозможен (или нарушено всасывание из ЖКТ).

Для **взрослых** средняя доза для в/в введения составляет 2 мл. В/м вводят 2-5 мл раствора 2-3 раза/сут; максимальная суточная доза - 10 мл. Продолжительность лечения не более 5 дней.

**Детям** дозы Спазмалина для в/м или в/в введения устанавливают в зависимости от возраста.

Возраст	Рекомендуемая доза
3-11 мес	0.1 мл
1-4 года	0.2 мл
5-7 лет	0.4 мл
8-11 лет	0.5 мл
12-14 лет	0.8 мл

При необходимости возможно повторное введение препарата в таких же дозах.

Требуется особая осторожность при введении 2 мл раствора и более (риск резкого снижения АД).

В/в инъекцию следует делать медленно, в положении пациента лежа, под контролем АД, ЧСС и частоты дыхания.

Раствор Спазмалина несовместим в одном шприце с другими лекарственными средствами.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* в единичных случаях - чувство жжения в эпигастральной области, сухость во рту.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* возможно - снижение АД, тахикардия, цианоз.

*Со стороны системы кроветворения:* при длительном приеме в отдельных случаях - тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз.

*Со стороны ЦНС:* возможно головокружение; очень редко - парез аккомодации; в единичных случаях - головная боль.

*Со стороны мочевыделительной системы:* редко (обычно при длительном приеме или при применении в высоких дозах) - нарушение функции почек, олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет; очень редко - задержка мочи.

*Аллергические реакции:* иногда - кожная сыпь, зуд; очень редко - анафилактический шок; в отдельных случаях - злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла); при предрасположенности к бронхоспазму - провоцирование приступа.

*Прочие:* очень редко - снижение потоотделения.

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* рвота, снижение АД, сонливость, спутанность сознания, тошнота, боли в эпигастральной области, нарушения функции печени и почек, судороги.

*Лечение:* промывание желудка, назначение активированного угля; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению в I триместре и в последние 6 недель беременности. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременное применение Спазмалина с другими неопиоидными анальгетиками может привести к взаимному усилению эффектов.

При одновременном применении трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола натрия в печени и повышают его токсичность.

При одновременном применении барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола натрия.

При одновременном применении Спазмалин снижает концентрацию циклоспорина в плазме крови.

При одновременном применении седативные средства и транквилизаторы усиливают анальгезирующее действие Спазмалина.

При одновременном применении с блокаторами гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, бутирофенонами, фенотиазинами, амантадином и хинидином возможно усиление м-холинолитического действия препаратов.

При одновременном применении с этанолом возможно взаимное усиление эффектов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При подозрении на агранулоцитоз или при наличии тромбоцитопении необходимо прекратить прием препарата.

При длительном (более недели) применении Спазмалина необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

В период применения препарата нельзя употреблять алкоголь.

## Спазмалин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период применения препарата не следует заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек. С *осторожностью* и под контролем врача следует применять препарат при нарушениях функцией почек.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени. С *осторожностью* и под контролем врача следует применять препарат при нарушениях функцией печени.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат противопоказан детям до 3 мес (или масса тела менее 5 кг).

Вопрос о назначении препарата детям и подросткам до 15 лет следует решать индивидуально.

**Детям** препарат назначают по строгим показаниям; дозу препарата устанавливают в зависимости от возраста: в **возрасте 6-8 лет** рекомендуемая разовая доза составляет 1/2 таб., **9-12 лет** - 3/4 таб., **13-15 лет** - 1 таб. Кратность приема - 2-3 раза/сут.

**Детям** дозы Спазмалина для в/м или в/в введения устанавливают в зависимости от возраста.

<b>Возраст</b>	<b>Рекомендуемая доза</b>
3-11 мес	0.1 мл
1-4 года	0.2 мл
5-7 лет	0.4 мл
8-11 лет	0.5 мл
12-14 лет	0.8 мл

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре ниже 30°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Spazmalin>