Спазмол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Дротаверин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** желтого или зеленовато-желтого цвета.

	1 таб.
дротаверина гидрохлорид	40 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, кальция стеарат, стеариновая кислота.

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Спазмолитик миотропного действия.

По химической структуре и фармакологическим свойствам близок к папаверину, но обладает более сильным и продолжительным действием. Снижает тонус и двигательную активность гладкой мускулатуры внутренних органов, расширяет кровеносные сосуды.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема препарата внутрь абсорбция высокая, период полуабсорбции составляет 12 мин. Биодоступность - 100%. Время достижения C_{max} в плазме крови - 2 ч.

Распределение

Равномерно распределяется в ткани, проникает в клетки гладкой мускулатуры. Связывание с белками плазмы - 95-98%. Не проникает через ГЭБ.

Выведение

В основном выводится почками, в меньшей степени - с желчью.

Показания к применению:

— профилактика и лечение функциональных состояний и болевого синдрома, вызванных спазмом гладкой мускулатуры (в т.ч. при хроническом гастродуодените, спастическом колите, хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; спазмы пилорического и кардиального отделов желудка; при мочекаменной болезни);

— альгодисменорея;

— для ослабления сокращений матки и снятия спазма шейки матки при родах;

— спазмы периферических сосудов;

— спазмы сосудов головного мозга;

— профилактика спазма гладкой мускулатуры при проведении инструментальных методов исследования.

Относится к болезням:

- Альгодисменорея
- Гастрит
- Гастродуоденит
- Желчнокаменная болезнь
- Кардит
- Колит
- Мочекаменная болезнь
- Спазмы
- Холера
- Холецистит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— AV-блокада II и III степени;

— выраженная сердечная недостаточность;

— выраженная печеночная недостаточность;

— выраженная почечная недостаточность;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 40-80 мг (1-2 таб.) 2-3 раза/сут.

Детям в возрасте до 6 лет препарат назначают внутрь в разовой дозе 10-20 мг (1/4-1/2 таб.), в возрасте **от 6 до 12 лет** - 20 мг (1/2 таб.) 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Возможны: головокружение, сердцебиение, артериальная гипотензия, чувство жара, повышенное потоотделение, аллергический дерматит.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Спазмол не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют препарат Спазмол в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Спазмол может ослаблять антипаркинсонический эффект леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с выраженным атеросклерозом коронарных артерий, гиперплазией предстательной железы, глаукомой.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженной почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженной печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте до 6 лет препарат назначают внутрь в разовой дозе 10-20 мг (1/4-1/2 таб.), в возрасте **от 6 до 12 лет** - 20 мг (1/2 таб.) 1-2 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Spazmol