Спазмомен



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Отилония бромид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
отилония бромид	40 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал рисовый, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, макрогол, тальк.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (ПВХ/ПВДХ/алюминиевая фольга) (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отилония бромид - действующее вещество препарата Спазмомен - является миотропным спазмолитиком: понижает тонус гладкой мускулатуры органов ЖКТ. Механизм действия сводится к способности отилония бромида влиять на транспорт ионов Ca^{2+} во внутри- и внеклеточном пространстве, а также перекрывать Ca^{2+}-каналы, мускариновые и тахикининовые рецепторы. Комбинация свойств блокатора Ca^{2+}-каналов и умеренно выраженного антимускаринового действия объясняет фармакологическое действие отилония бромида.

Фармакокинетика

Всасывание

После перорального приема отилония бромид всасывается из ЖКТ в очень незначительном количестве (3 %), в связи с чем уровень концентрации препарата в плазме очень низкий.

Распределение

Высокая степень распределения в гладкой мускулатуре прямой кишки.

Выведение

Большая часть абсорбированного препарата выводится через желчные протоки (95-97 %).

Показания к применению:

— спастические состояния, дискинезии (по гиперкинетическому типу) органов ЖКТ (эзофагит, гастрит, дуоденит, энтерит, синдром раздраженного кишечника);

— подготовка пациентов к эндоскопическому обследованию органов ЖКТ.

Относится к болезням:

- Дуоденит
- Синдром раздраженного кишечника
- Эзофагит
- Энтерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к отилония бромиду или другим компонентам препарата;

— детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: глаукома; стеноз привратника; гипертрофия предстательной железы.

Способ применения и дозы:

Если не предписано иначе, Спазмомен следует принимать внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.

Данные относительно эффективности и безопасности отилония бромида у **детей** отсутствуют.

Побочное действие:

При приеме препарата Спазмомен в терапевтических дозах побочных эффектов не выявлено, в частности, препарат не вызывает атропинонодобных реакций.

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Поскольку препарат практически нетоксичен, о случаях передозировки сообщений не было. В случае передозировки лечение должно носить симптоматический и поддерживающий характер.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные доклинических исследований показывают отсутствие тератогенного и мутагенного эффектов препарата, но его применение во время беременности и в период лактации возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Об отрицательном влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

сообщений не было.

Применение в детском возрасте

Противопоказно детям до 3 лет.

Данные относительно эффективности и безопасности отилония бромида у детей отсутствуют.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Spazmomen