

Спазмомен



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Отилония бромид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
отилония бромид	40 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал рисовый, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, макрогол, тальк.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (ПВХ/ПВДХ/алюминиевая фольга) (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отилония бромид - действующее вещество препарата Спазмомен - является миотропным спазмолитиком: понижает тонус гладкой мускулатуры органов ЖКТ. Механизм действия сводится к способности отилония бромида влиять на транспорт ионов Ca^{2+} во внутри- и внеклеточном пространстве, а также перекрывать Ca^{2+} -каналы, мускариновые и тахикининовые рецепторы. Комбинация свойств блокатора Ca^{2+} -каналов и умеренно выраженного антимускаринового действия объясняет фармакологическое действие отилония бромида.

Фармакокинетика

Всасывание

После перорального приема отилония бромид всасывается из ЖКТ в очень незначительном количестве (3 %), в связи с чем уровень концентрации препарата в плазме очень низкий.

Распределение

Высокая степень распределения в гладкой мускулатуре прямой кишки.

Выведение

Большая часть абсорбированного препарата выводится через желчные протоки (95-97 %).

Показания к применению:

- спастические состояния, дискинезии (по гиперкинетическому типу) органов ЖКТ (эзофагит, гастрит, дуоденит, энтерит, синдром раздраженного кишечника);
- подготовка пациентов к эндоскопическому обследованию органов ЖКТ.

Относится к болезням:

- [Дуоденит](#)
- [Синдром раздраженного кишечника](#)
- [Эзофагит](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к отилония бромиду или другим компонентам препарата;
- детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: глаукома; стеноз привратника; гипертрофия предстательной железы.

Способ применения и дозы:

Если не предписано иначе, Спазмомен следует принимать внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки.

Данные относительно эффективности и безопасности отилония бромида у **детей** отсутствуют.

Побочное действие:

При приеме препарата Спазмомен в терапевтических дозах побочных эффектов не выявлено, в частности, препарат не вызывает атропиноподобных реакций.

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Поскольку препарат практически нетоксичен, о случаях передозировки сообщений не было. В случае передозировки лечение должно носить симптоматический и поддерживающий характер.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные доклинических исследований показывают отсутствие тератогенного и мутагенного эффектов препарата, но его применение во время беременности и в период лактации возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Об отрицательном влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Спазмомен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

сообщений не было.

Применение в детском возрасте

Противопоказно детям до 3 лет.

Данные относительно эффективности и безопасности отилония бромиды у детей отсутствуют.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Spazmomen>