

[Сперматекс](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензалкония хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр МНН](#) [Википедия МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)[англ](#)

Форма выпуска:

◊ **Суппозитории вагинальные** почти белого цвета, однородные, полупрозрачные, цилиндрические, с одним овальным концом.

	1 супп.
бензалкония хлорид	18.9 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 6000, метилпарабен, пропилпарабен, бутилгидрокситолуол.

10 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Контрацептивное средство для местного применения. Обладает сперматоцидным действием, которое обусловлено способностью повреждать мембранны сперматозоидов (в начале - жгутиков, затем - головки), что обуславливает невозможность оплодотворения поврежденным сперматозоидом.

Обладает противогрибковым, противопротозойным действием; активен в отношении вируса Herpes simplex. Оказывает также антисептическое действие. Проявляет бактерицидную активность в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp., грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Klebsiella spp.), анаэробных бактерий, грибов и плесеней. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтическим лекарственным средствам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Проявляет активность в предупреждении заболеваний, передающихся половым путем (гонорея, хламидиоз, трихомониаз). Не влияет на нормальную микрофлору влагалища (в т.ч. на палочку Додерляина) и гормональный цикл.

Эффект развивается через 5 минут после введения суппозитория вагинального.

Фармакокинетика

Практически не всасывается при интравагинальном введении, удаляется простым подмыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями.

Показания к применению:

— местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста (наличие противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочной контрацепции; послеродовый период, период лактации, период после прерывания беременности, пременопаузный период, необходимость эпизодического предохранения от беременности, пропуск или опоздание в приеме постоянно используемых пероральных контрацептивов).

Относится к болезням:

- Контрацепция

Противопоказания:

- кольпит;
- изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и матки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Суппозиторий вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине за 5 мин до полового акта.

Разовая доза: 1 суппозиторий рассчитан на 1 половой акт. Длительность действия - 4 ч.

В случае повторного полового акта следует обязательно вводить новый вагинальный суппозиторий. Кратность применения зависит от индивидуальной переносимости действующего вещества и частоты половых актов.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергические реакции (жжение, зуд), контактный дерматит.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Сперматекс не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не оказывает отрицательного влияния на течение беременности. Не выделяется с грудным молоком, можно применять в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Любое лекарственное средство, введенное интравагинально, может снижать местное спермицидное действие (в т.ч. мыло и растворы, его содержащие).

Растворы йода (в т.ч. 0.1% раствор йодоната) инактивируют препарат.

Особые указания и меры предосторожности:

Для повышения эффективности необходимо тщательное соблюдение способа применения препарата.

Возможно применение совместно с влагалищной диафрагмой или внутриматочной контрацепцией.

После коитуса не рекомендуется интравагинальное использование гигиенических средств (спринцевания мыльной

водой, т.к. мыло разрушает активную субстанцию препарата) во избежание потери контрацептивного эффекта; возможен наружный туалет половых органов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Spermateks>