Спигелон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми, коричневатыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; без запаха.

	1 таб.
Spigelia anthelmia (спигелия антгельмия) D3	30 мг
Atropa bella-donna (атропа белладонна) D3	30 мг
Bryonia (бриония) D3	30 мг
Gelsemium sempervirens (гельземиум семпервиренс) D3	30 мг
Melilotus officinalis (мелилотус оффициналис) D3	30 мг
Natrium carbonicum (натриум карбоникум) D3	30 мг
Acidum silicicum (ацидум силицикум) D12	60 мг
Thuja occidentalis (туя окциденталис) D12	60 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— головная боль различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).

Относится к болезням:

- Головная боль
- Мигрень

Противопоказания:

— детский возраст до 3-х лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс лечения определяется врачом.

Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Spigelon