

Споровактерин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бациллюс субтилис](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суспензия для приема внутрь** в виде взвеси белого или слегка желтоватого цвета со специфическим запахом и соленым вкусом; при отстаивании образуется рыхлый осадок разных оттенков от белого до светло-коричневого цвета, разбивающийся при встряхивании.

	1 мл
биомасса живых бацилл <i>Bacillus subtilis</i> 534	не менее 1×10^9 КОЕ

Вспомогательные вещества: натрия хлорид 70 мг/мл, вода очищенная до 1 мл.

- 1 доза - флаконы (5) - пачки картонные.
- 1 доза - флаконы (10) - пачки картонные.
- 10 доз - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
- 10 доз - флакон-капельницы полимерные (2) - пачки картонные.
- 2 дозы - флаконы (5) - пачки картонные.
- 2 дозы - флаконы (10) - пачки картонные.
- 5 доз - флаконы (5) - пачки картонные.
- 5 доз - флаконы (10) - пачки картонные.
- 5 доз - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
- 5 доз - флакон-капельницы полимерные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бактерии *Bacillus subtilis* штамма 534 выделяют антибактериальные вещества широкого спектра действия,

подавляющие развитие ряда патогенных и условно-патогенных бактерий. Рост сапрофитов, в том числе и нормальной микрофлоры кишечника, споровактерином не угнетается.

Культура *Bacillus subtilis* штамма 534 продуцирует также другие биологически активные вещества, такие как протеолитические ферменты, лизоцим, липазы, амилазы и другие, способствующие расщеплению углеводов, жиров и белков, участвуя в переваривании и усвоения пищи. Кроме того, ферменты бактерий способствуют очищению ран, воспалительных очагов от некротизированных тканей. Препарат оказывает выраженное иммуностимулирующее действие, в том числе на поглотительную и переваривающую активность фагоцитирующих клеток крови, обладает умеренным антиаллергическим эффектом.

Показания к применению:

Споровактерин применяют для лечения:

- острых бактериальных кишечных инфекций, в том числе острой дизентерии, сальмонеллезов и др.;
- дисбактериозов различной этиологии;
- хирургической инфекции мягких тканей;
- остеомиелита (при отсутствии крупных секвестров);
- для профилактики и лечения осложнений, вызываемых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами при хирургических и акушерско-гинекологических операциях.

Споровактерин назначают детям старше 6 месяцев и взрослым.

Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Сальмонеллез](#)

Противопоказания:

Противопоказаний для применения споровактерина не выявлено. Препарат следует применять с осторожностью при лекарственной аллергии. Действие препарата на беременных не изучалось.

Непригоден для применения: препарат, целостность упаковки которого нарушена; препарат без маркировки; препарат с измененными физическими свойствами и наличием посторонних примесей.

Способ применения и дозы:

Назначенную дозу препарата разводят в 10-15 раз остуженной кипяченой водой. Споровактерин назначают за 30-40 мин до еды.

для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта:

ДЕТЯМ:

— для лечения острых бактериальных кишечных инфекций, в том числе острой дизентерии, сальмонеллезов: в возрасте от 6 месяцев до 3 лет назначают через рот по 0.5 мл (8-10 капель) 2 раза в день в течение 7-10 сут; старше 3 лет - по 1 мл (17-20 капель) 2 раза в день в течение 7-10 сут;

— для лечения дисбактериозов после перенесенных бактериальных инфекций или применения антибиотиков: в возрасте от 6 месяцев до 3 лет назначают через рот по 0.5 мл (8-10 капель) 2 раза в день в течение 20 сут, старше 3 лет - по 1 мл (17-20 капель) 2 раза в день в течение 20 сут. При наличии дисбактериоза у кормящей матери, ей рекомендуется прием препарата по 1 мл 2 раза в день в течение периода лечения ребенка.

ВЗРОСЛЫМ:

— для лечения острых бактериальных кишечных инфекций, в том числе острой дизентерии, сальмонеллезов: препарат назначают через рот по 1 мл (17-20 капель) 2 раза в день в течение 7-10 сут;

— для лечения дисбактериозов после перенесенных бактериальных инфекций или применения антибиотиков: препарат назначают через рот по 1 мл 2 раза в день в течение 20 сут.

в хирургической практике:

— для лечения и профилактики хирургической инфекции мягких тканей: препарат назначают через рот по 1 мл 2 раза в день в течение 7-10 сут;

— для профилактически гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде: препарат назначают через рот по 5 мл 1 раз в день (на ночь) в течение 5 дней до операции и по 5 мл 1 раз в день (на ночь) в течение 5 дней после операции или травмы.

При необходимости курсы лечения могут быть повторены.

! Вскрытый флакон с препаратом, закрытый крышкой, может храниться не более 10 сут при температуре от 4 до 8°C.

Побочное действие:

В редких случаях возможно возникновение побочных явлений в виде озноба, сыпи на коже, болей в животе, диареи. При уменьшении дозировки либо отмене препарата эти явления полностью купируются в течение суток.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Действие препарата на беременных не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение антибиотиков и сульфаниламидов может снижать лечебную эффективность споробактерина.

Особые указания и меры предосторожности:

Способность влиять на управление транспортными средствами и работать с механизмами. Применение препарата на управление транспортными средствами и работу с механизмами влияния не оказывает.

Применение в детском возрасте

Споробактерин назначают детям старше 6 месяцев.

Условия хранения:

Препарат хранят и транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре до 10°C, в недоступном для детей месте. Допустима транспортировка при температуре до 25°C не более 14 дней.

Срок годности. 2 года. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sporobakterin>