

[Спрегаль](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиперонил бутоксид](#)
- [Эсбиол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль для наружного применения** в виде прозрачного раствора от светло-желтого до темно-желтого цвета.

	10 г	152 г
эсдепаллетрин (эсбиол)	66 мг	1.008 г
пиперонила бутоксид	531 мг	8.064 г

Вспомогательные вещества: этанол 96%, макроглицириды, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир, пропеллент HFA 134a.

152 г - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном непрерывного действия (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения чесотки. Входящий в состав препарата эсдепаллетрин является нейротоксичным ядом для насекомых. Механизм действия заключается в нарушении катионного обмена мембран нервных клеток. Пиперонила бутоксид усиливает действие эсдепаллетрина.

Фармакокинетика

Компоненты, входящие в состав препарата, обнаруживаются в крови пациента через 1 ч после наружного применения Спрегалья. C_{max} эсдепаллетрина достигается через 1 ч после применения препарата; C_{max} пиперонила бутоксида - через 2 ч после применения. Через 24 ч после применения препарата концентрация его компонентов в плазме крови минимальна, а в некоторых случаях не определяется. Через 48 ч после применения Спрегалья никаких следов его компонентов в плазме крови пациента не обнаруживается.

Показания к применению:

— лечение чесотки.

Относится к болезням:

- [Чесотка](#)

Противопоказания:

- бронхиальная астма;
- обструктивный бронхит;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* назначают препарат при беременности.

Способ применения и дозы:

Лечение предпочтительно начинать вечером (после 18-19 ч), чтобы препарат действовал в течение ночи. После нанесения препарата не следует мыться. Перед употреблением необходимо тщательно встряхнуть баллон. Путем распыления препарат тщательно наносят на поверхность тела (кроме кожи лица и головы) на расстоянии 20-30 см от поверхности кожи. Препарат сначала наносят на туловище, а потом на конечности (обработанные участки начинают лосниться). Особенно тщательно препарат наносят между пальцами рук, ног, в области подмышек, промежности, на все сгибы и пораженные участки и оставляют на коже на 12 ч. Через 12 ч необходимо тщательно вымыться с мылом и вытереться.

Как правило, однократного применения Спрегали достаточно. Однако необходимо иметь в виду, что даже в случае эффективности проведенного лечения зуд и другие симптомы могут наблюдаться еще 8-10 дней. Если по истечении этого срока симптомы сохраняются, можно нанести препарат повторно.

При лечении **детей и новорожденных** во время распыления препарата необходимо закрыть им нос и рот салфеткой; в случае смены пеленок необходимо заново обработать всю зону ягодич. При локализации расчесов на лице их обрабатывают ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно появление ощущения легкого жжения, которое обычно быстро проходит.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Спрегаль не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период лактации следует отказаться от грудного вскармливания на период лечения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Спрегаль неизвестно.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении.

Одного баллона препарата Спрегаль достаточно для лечения 3-4 человек.

Спрегаль

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Необходимо избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза следует тщательно промыть их теплой водой.

Во избежание вторичного заражения необходимо обработать постель и одежду.

Препарат противопоказан при бронхиальной астме, обструктивном бронхите только из-за аэрозольной формы. В этом случае возможно нанесение препарата на кожу ватным тампоном, смоченным Спрегалем.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре.

Баллон находится под давлением: предохранять от попадания солнечных лучей и не подвергать температурным воздействиям более 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять на источник огня или на раскаленный предмет.

Использовать и хранить вдали от огня, источников тепла и включенных электроприборов.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Spregal>