

Стелланин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диэтилбензимидазолия трийодид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь и местного применения	1 мл
диэтилбензимидазолия трийодид	40 мг
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.	
Мазь для наружного применения 3%	100 г
диэтилбензимидазолия трийодид	3 г

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Активным компонентом препарата Стелланин является 1.3-диэтилбензимидазолия трийодид. Механизм фармакологической активности препарата заключается в непосредственном регенерационном действии 1.3-диэтилбензимидазолия на поврежденные кожные покровы. Активный йод, входящий в состав препарата, инактивирует белки бактериальной стенки и ферментные белки бактерий, оказывая тем самым бактерицидное действие.

Стелланин защищает поверхность раны от инфекций, подавляет течение инфекционного процесса и способствует заживлению.

Препарат обладает широким спектром антибактериальной активности.

К Стелланину чувствительны бактерии *Staphylococcus aureus*, *Clostridium difficile*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus viridans*, *Streptococcus haemolyticus*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Neisseria* spp.; грибы *Candida albicans* и некоторые другие возбудители.

Фармакокинетика

Мазь

Системное всасывание действующего вещества отсутствует даже при поврежденной коже, тем не менее, в ране присутствуют терапевтические концентрации препарата.

Капли для приема внутрь и местного применения

При приеме внутрь время достижения $C_{\max}$ йода в плазме в среднем составляет 2.05 ± 0.55 ч. Величина $C_{\max}$ йодидов в плазме крови в среднем составляет 2.80 ± 0.51 мкг/мл, $T_{1/2}$ и среднее время удержания в организме – 4.42 ± 0.93 и 5.07 ± 0.19 ч.

Показания к применению:

Для мази

- трофические язвы нижних конечностей;
- пролежни;
- ожоги I и II степени;
- ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы, в т.ч. после укусов насекомых;
- дополнительное лечение асептических послеоперационных ран (после иссечения, коагуляции, эпизиотомии, для лечения трещин на коже, ран и швов);
- ускорение приживления кожного трансплантата.

Капли для приема внутрь и местного применения

- хронический тонзиллит;
- фарингит в стадии обострения.

Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Ссадины](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Трофические язвы](#)
- [Фарингит](#)
- [Царапины](#)

Противопоказания:

- тиреотоксикоз;
- аденома щитовидной железы;
- острая почечная недостаточность;
- одновременная терапия радиоактивным йодом;
- дети до 18 лет;
- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

Способ применения и дозы:

Мазь

Препарат наносят на поврежденную поверхность кожи так, чтобы участок кожи был покрыт препаратом полностью. Продолжительность и кратность нанесения препарата зависит от тяжести заболевания и локализации процесса. Суточная доза не должна превышать 10 г. Возможно использование окклюзионных повязок и пластыря.

При лечении *гранулирующих ожогов, ран и трофических язв со слабой экссудацией* препарат наносят равномерным

слоем толщиной 1-1.5 мм таким образом, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта мазью, и накладывают стерильную марлевую повязку. Смену повязок проводят 1 раз в 1-2 сут при лечении ожогов и 1-2 раз/сут при лечении ран и трофических язв. При открытом способе лечения ожогов препарат наносят 1-2 раза/сут. Продолжительность лечения определяется динамикой эпителизации ран.

При незначительных повреждениях кожи (ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы) препарат наносят тонким слоем на пораженную поверхность 2 раза/сут.

Капли для приема внутрь и местного применения

Местно. Внутрь.

Строго натощак, не менее, чем за 30 мин до приема пищи.

По 1 мл (50 капель, содержащих 40 мг 1.3-диэтилбензимидазолия трийодида) препарата, разведенного в 50 мл (1/4 стакана) кипяченой воды комнатной температуры в стеклянной посуде 2-3 раза/сут внутрь. Перед приемом внутрь горло необходимо предварительно прополоскать раствором препарата.

Максимальная суточная доза - 3 мл (120 мг 1.3-диэтилбензимидазолия трийодида). Курс лечения - 5-10 дней.

Побочное действие:**Мазь**

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции (зуд, гиперемия кожи), при появлении которых следует прекратить применение препарата.

Капли для приема внутрь и местного применения

Аллергические реакции, эозинофилия, тахикардия, нервозность, бессонница.

Передозировка:**Мазь**

Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Капли для приема внутрь и местного применения

Симптомы: окрашивание слизистой оболочки рта в коричневый цвет, ринит, бронхит, гастроэнтерит, отек голосовых связок, кровотечение из мочевыводящих путей, анурия, коллапс.

Лечение: промывание желудка раствором крахмала (до исчезновения синей окраски раствора) и 1% раствором натрия тиосульфата, прием кашицы из муки, кукурузного, картофельного, рисового или овсяного густого отвара, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан в I триместре беременности.

С осторожностью: II и III триместры беременности, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**Мазь**

Не следует применять препарат в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества.

В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшиться.

Капли для приема внутрь и местного применения

Стелланин не рекомендуется принимать внутрь одновременно с другими лекарственными препаратами.

Интервал между приемом Стелланина и других препаратов должен составлять не менее 30 мин.

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь нельзя наносить на слизистые оболочки.

При попадании препарата в глаза или на слизистую оболочку необходимо промыть теплой водой.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острой почечной недостаточности.

С осторожностью назначают при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Мазь следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре 0-25°C.

Капли для приема внутрь и местного применения следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Stellanin>