# Стелланин-ПЭГ

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диэтилбензимидазолия трийодид

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Мазь для наружного применения 3%*** | **100 г** |
|---|---|
| диэтилбензимидазолия трийодид | 3 г |

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Механизм фармакологической активности препарата заключается в антибактериальном действии 1.3-диэтилбензимидазолия. Активный йод, входящий в состав 1.3-диэтилбензимидазолия трийодида, инактивирует белки бактериальной стенки и ферментные белки бактерий, оказывая тем самым бактерицидное действие на микроорганизмы. Выраженное антимикробное действие препарата предотвращает инфицирование ран.

Наряду с антибактериальным и противовоспалительным эффектами, мазь обладает высоким осмотическим потенциалом, что особенно важно при лечении гнойных ран, т.к. способствует эвакуации из раневого дефекта гнойного отделяемого.

***Фармакокинетика***

Системное всасывание действующего вещества отсутствует даже при поврежденной коже, тем не менее, в ране присутствуют терапевтические концентрации препарата.

## Показания к применению:

— лечение острых гнойных процессов (ран) кожи и мягких тканей (фурункулы, карбункулы, гидроадениты, флегмоны, абсцессы);

— дополнительное лечение гнойных осложнений послеоперационных ран (после иссечения, коагуляции, эпизиотомии, для лечения трещин на коже, ран и швов);

— термические поражения кожи и мягких тканей I-III степеней, осложненные инфекционным процессом;

— трофические язвы, пролежни, осложненные инфекционным процессом.

—- ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы.

## Относится к болезням:

- Абсцесс
- Инфекции
- Карбункул
- Поражения кожи
- Порезы
- Пролежни
- Ссадины
- Флегмона
- Царапины

## Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— тиреотоксикоз;

— аденома щитовидной железы;

— тяжелая почечная недостаточность;

— одновременная терапия радиоактивным йодом;

— дети до 18 лет;

— I триместр беременности.

*С осторожностью:* хроническая почечная недостаточность, II и III триместры беременности, период лактации.

## Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем около 1.5-2 мм непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или препарат наносят на перевязочный материал, а затем на рану. Слой мази должен превосходить по окружности размеры раны не менее чем на 5 мм. Тампонами, пропитанными мазью, рыхло заполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с препаратом вводят в свищевые ходы. При локализации раны на неудобном для бинтования месте допустимо использование лейкопластырной или клеевой повязки.

Смену повязок проводят 1-2 раза в сут.

Суточная доза не должна превышать 10 г. Длительность лечения в среднем составляет 5 - 15 дней.

При незначительных повреждениях кожи (ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы) препарат наносят тонким слоем на пораженную поверхность 2 раза в день.

## Побочное действие:

В редких случаях возможны кожные аллергические реакции (зуд, гиперемия кожи), при появлении которых следует прекратить применение препарата.

## Передозировка:

Случаи передозировки не описаны. При случайном приёме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат в I триместр беременности.

С осторожностью принимать в II и III триместры беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять препарат в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.

## Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания мази в глаза. При попадании препарата в глаза необходимо промыть теплой водой.

***При нарушениях функции почек***

Запрещено использовать при тяжелой почечной недостаточности.

С осторожностью: хроническая почечная недостаточность.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 18 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 0-25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности -** 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Stellanin-PEG