Стимфорте



Код АТХ:

- L03AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения в виде лиофилизированной массы светло-желтого цвета.

	1 упаковка
стимфорте (водная вытяжка из органов и тканей ужей)	3 мг

3 мг - ампулы стеклянные (4) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - ампулы стеклянные (8) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - флаконы стеклянные (2) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - флаконы стеклянные (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - флаконы стеклянные (4) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - флаконы стеклянные - пачки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения в виде лиофилизированной массы светло-желтого цвета.

	1 упаковка
стимфорте (водная вытяжка из органов и тканей ужей)	6 мг

6 мг - ампулы стеклянные (4) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 мг - ампулы стеклянные (8) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 мг - флаконы стеклянные (2) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 мг - флаконы стеклянные (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 мг - флаконы стеклянные (4) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 мг - флаконы стеклянные - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимфорте оказывает иммуностимулирующее действие, активируя различные звенья иммунитета, в том числе продукцию цитокинов. Препарат в 1.5-2.5 раза усиливает фагоцитоз в макрофагах и функциональную активность NK-клеток, повышая их цитотоксические свойства. Индуцирует образование гамма-интерферона, фактора некроза опухолей альфа, интерлейкина-6 и интерлейкина-1. Под действием препарата увеличивается количество

лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов, а также происходит активация последних.

При изучении фармакологической активности Стимфорте было установлено, что препарат неспецифически усиливает противовирусный иммунитет.

Фармакокинетика

Период полураспределения в организме - 25-30 мин, полувыведения - 24 часа. Продукты метаболизма выводятся через почки и легкие. Не кумулирует.

Показания к применению:

У взрослых в составе комплексной терапии вторичных иммунодефицитных состояний, вызванных острыми и хроническими бактериальными и вирусными инфекциями (в стадии обострения и ремиссии):

— генитальный герпес;

— рецидивирующий фурункулез;

— хронический вирусный гепатит В (в стадии обострения);

— острый гепатит В (среднетяжелые формы).

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Герпес
- Инфекции
- Фурункул

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность;

— аутоиммунные заболевания;

— беременность, период лактации (эффективность и безопасность не установлены);

— детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Стимфорте предназначен для внутримышечного введения. Препарат растворяют непосредственно перед применением - 3 мг в 3 мл и 6 мг в 6 мл 0,9% раствора натрия хлорида.

Курс лечения состоит из 4 инъекций, по одной инъекции каждые 72 часа в дозах 0.75; 1.5; 1.5; 1.5 мг. В случае недостаточной эффективности дозу можно увеличить в 2 раза - 1.5; 3.0; 3.0; 3.0 мг через каждые 72 часа.

В *комплексной терапии острого и хронического гепатита* используют следующую схему из 4-х инъекций: 1,5 мг, через 72 часа - 1,5 мг, перерыв 7 дней, далее еще 2 инъекции по 3 мг с перерывом в 72 часа.

При необходимости повторный курс лечения можно проводить через 14 дней.

Побочное действие:

Возможно кратковременное повышение температуры тела до субфебрильных значений, головная боль, преходящие гиперемия и болезненность в месте инъекции.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Стимфорте совместим с противовирусными препаратами и цитостатиками.

Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения препаратом необходимо исключить употребление алкоголя.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 8°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stimforte