Стимол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цитруллина малат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для приема внутрь*** бесцветный или желтоватого цвета, с запахом апельсина.

	1 мл	**1 пак.**
цитруллина малат	100 мг	1 г

Вспомогательные вещества: натуральный ароматизатор апельсина сангриа, натрия гидроксида раствор 30%, вода очищенная.

10 мл - пакетики из комбинированного материала (18) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, применяемый при астенических состояниях. Оказывает общетонизирующее действие, а также способствует детоксикации печени.

Цитруллин — аминокислота, участвующая в протекающем в печени цикле нейтрализации аммиака, образующегося в результате распада азотсодержащих соединений. В печени из аммиака образуется мочевина. Цитруллин встраивается в цикл мочевины, повышает выведение ионов аммония.

Малат вовлекается в цикл Кребса и глюконеогенез, снижает концентрацию лактата в крови, способствует нормализации обмена веществ, активирует неспецифические защитные факторы организма.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема внутрь препарат быстро всасывается из ЖКТ. C_{max} в плазме крови достигается в среднем через 50 мин. Быстро выводится из плазмы. Через 6 ч концентрация в плазме близка к физиологической.

Метаболизм и выведение

Т.к. активный компонент включается в процессы клеточного метаболизма, то лишь небольшие его количества обнаруживаются в моче.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение функциональной астении:

— астенический синдром;

— переутомление;

— повышенная усталость;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Относится к болезням:

- Астения

Противопоказания:

— язвенная болезнь в фазе обострения;

— детский возраст до 5 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и пациентам пожилого возраста - 3 пакетика/сут.

Детям в возрасте 5 лет и старше - 2 пакетика/сут.

Стимол следует принимать во время еды, смешивая содержимое пакетиков с водой или подслащенным напитком. Курс приема препарата - 10-12 дней. Повторные курсы возможны с интервалом 1-3 мес или в соответствии с рекомендацией врача.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: в начале лечения возможны преходящие боли в области желудка.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Стимол не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Стимол при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Стимол не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку в составе препарата Стимол нет сахара, препарат можно назначать пациентам с сахарным диабетом.

В каждом пакетике содержится около 30 мг натрия. Это следует учитывать при необходимости применения препарата у пациентов, находящихся на бессолевой диете.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 5 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stimol