

[Стизамет](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диоксометилтетрагидропиримидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com^{англ}](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее средство, диоксометилтетрагидропиримидин. Способствует нормализации обмена нуклеиновых кислот, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряет рост и грануляционное созревание ткани и эпителилизацию (в т.ч. в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки ЖКТ), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета. Обладает анаболической активностью, противовоспалительным действием. При наружном применении оказывает также фотопротекторное действие.

Показания к применению:

Для приема внутрь: лейкопения (легкие формы, в т.ч. возникшая в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангинав, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, панкреатит.

Для наружного применения: вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, фотодерматит; трофические язвы, пролежни, глубокие раны.

Для местного применения: проктит, сигмоидит, язвенный колит.

Относится к болезням:

- [Агранулоцитоз](#)
- [Аденоиды \(гипертрофия глоточной миндалины\)](#)
- [Ангина](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Колит](#)

- [Лейкоз](#)
- [Ожоги](#)
- [Панкреатит](#)
- [Проктит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Реконвалесценция](#)
- [Тромбоз](#)
- [Трофические язвы](#)
- [Фотодерматоз](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к метилурацилу.

Для приема внутрь: лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогрануломатоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга.

Для наружного и местного применения: избыточные грануляции в ране.

Способ применения и дозы:

Внутрь, во время или после еды, по 500 мг 4 раза/сут (при необходимости - до 6 раз/сут); детям от 3 до 8 лет - по 250 мг, старше 8 лет - по 250-500 мг 3 раза/сут. Курс при заболеваниях органов ЖКТ - 30-40 дней; в других случаях может быть менее продолжительным.

При наружном применении режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от используемой лекарственной формы. Частота смены повязок зависит от глубины и площади раневой поверхности, интенсивности экссудации и наличия некротических масс.

Ректально применяют у взрослых по 0.5-1 г 3-4 раза/сутки; у детей в возрасте 3-8 лет - по 250 мг/сут, в возрасте 8-15 лет - по 500 мг/сут. Курс лечения - от 1 нед. до 4 мес.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции; при приеме внутрь - головная боль, головокружение, изжога.

Особые указания и меры предосторожности:

Лекарственные формы метилурацила следует применять строго по соответствующим показаниям.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Stizamet>