

Стоматидин



Код АТХ:

- [A01AB12](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гексэтидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Раствор для местного применения 0.1%** прозрачный, красного цвета, с характерным запахом, при взбалтывании пенится.

	100 мл
гексэтидин	100 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, полисорбат, лимонной кислоты моногидрат, натрия сахарин, ментол, метилсалицилат, азорубин CL 14720, этанол 96%, вода очищенная.

200 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Гексэтидин оказывает

противомикробное и слабое анальгезирующее действие на слизистую оболочку полости рта.

Показания к применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: тонзиллиты (в т.ч. ангина Венсана), фарингит, гингивит, кровоточивость десен, периодонтит, стоматит, глоссит, афтозные язвы;
- с целью профилактики инфицирования альвеол после удаления зубов;
- грибковые инфекции полости рта и глотки (особенно кандидозный стоматит до и после операций);
- травмы полости рта и глотки;
- в качестве дезодорирующего средства для устранения неприятного запаха изо рта;
- для профилактики суперинфекций в случае опухолей полости рта и глотки в стадии распада.

Относится к болезням:

- [Альвеолит](#)
- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Опухоли](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При заболеваниях полости рта и глотки следует полоскать рот 10-25 мл неразведенного раствора Стоматидина в течение 0.5 мин. Полоскание проводят 2 раза/сут, предпочтительно утром и вечером после еды. При необходимости возможно более частое применение препарата.

Препарат предназначен только для местного применения (раствор нельзя проглатывать!). Для полоскания всегда следует использовать неразведенный раствор, при лечении заболеваний полости рта его также можно наносить при помощи тампона.

Побочное действие:

В отдельных случаях: реакции повышенной чувствительности; при длительном применении - нарушение вкуса.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Стоматидин не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данных об отрицательном влиянии применения препарата Стоматидин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении раствора по показаниям и в рекомендованных дозах взаимодействие с другими лекарственными средствами не ожидается.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат можно назначать только в том случае, когда пациент в состоянии выплюнуть раствор после полоскания.

При появлении признаков повышенной чувствительности к гексетидину препарат следует немедленно отменить.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Stomatidin>