

[Стоматофит А](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Экстракт для местного применения (жидкий)	1 фл.
цветки ромашки аптечной	1.625 г
кора дуба	1.625 г
листья шалфея лекарственного	1.625 г
трава арники	0.812 г
корневища аира болотного	0.812 г
листья мяты перечной	0.812 г
трава тимьяна обыкновенного	0.812 г
бензокаин	0.5 г

Вспомогательные вещества: вода очищенная 6.487 г, гиэтеллоза 0.5 г, глицерол 4 г, этанол 96% 1.013 г.

25 г - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство происхождения. Оказывает противовоспалительное, вяжущее и антисептическое действие, а также уменьшает кровоточивость десен благодаря компонентам растительного сырья. Бензокаин оказывает местное анестезирующее действие.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта, в т.ч. стоматит; гингивит; афты; язвенные поражения полости рта, вызванные зубными протезами; как вспомогательное средство при пародонтозе.

Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Смазывать пораженные участки в полости рта не менее 3 раз/сут. Курс лечения - 5 дней.

Побочное действие:

Диагнозы

- Брекеты
- Галитоз (неприятный запах изо рта)
- Зубной абсцесс
- Зубной камень

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с отсутствием клинических данных.

Особые указания и меры предосторожности:

При использовании в форме спиртового экстракта с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени, при черепно-мозговой травме, при заболеваниях головного мозга и алкоголизме.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами)

Источник: http://drugs.thead.ru/Stomatofit_A