# Стоматофит А

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

| ◊ ***Экстракт для местного применения (жидкий)*** | **1 фл.** |
|---|---|
| цветки ромашки аптечной | 1.625 г |
| кора дуба | 1.625 г |
| листья шалфея лекарственного | 1.625 г |
| трава арники | 0.812 г |
| корневища аира болотного | 0.812 г |
| листья мяты перечной | 0.812 г |
| трава тимьяна обыкновенного | 0.812 г |
| бензокаин | 0.5 г |

Вспомогательные вещества: вода очищенная 6.487 г, гиэтеллоза 0.5 г, глицерол 4 г, этанол 96% 1.013 г.

25 г - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированное лекарственное средство происхождения. Оказывает противовоспалительное, вяжущее и антисептическое действие, а также уменьшает кровоточивость десен благодаря компонентам растительного сырья. Бензокаин оказывает местное анестезирующее действие.

## Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта, в т.ч. стоматит; гингивит; афты; язвенные поражения полости рта, вызванные зубными протезами; как вспомогательное средство при пародонтозе.

## Относится к болезням:

- Гингивит
- Пародонтит
- Стоматит

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, детский возраст до 18 лет.

## Способ применения и дозы:

Смазывать пораженные участки в полости рта не менее 3 раз/сут. Курс лечения - 5 дней.

## Побочное действие:

Диагнозы

- Брекеты
- Галитоз (неприятный запах изо рта)
- Зубной абсцесс
- Зубной камень

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с отсутствием клинических данных.

## Особые указания и меры предосторожности:

При использовании в форме спиртового экстракта с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени, при черепно-мозговой травме, при заболеваниях головного мозга и алкоголизме.

*Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами*

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, , работа с движущимися механизмами

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Stomatofit_A