Стопангин



Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гексэтидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для местного применения 0.1%*** прозрачный, светло-красного цвета, со специфическим запахом; допускается появление незначительного осадка, не влияющего на качество препарата.

	100 мл
гексэтидин	100 мг

Вспомогательные вещества: метилсалицилат - 17.55 мг, эфирное масло мяты перечной - 60.6 мг, масло гвоздичное - 8.4 мг, масло анисовое эфирное - 36.45 мг, масло эвкалиптовое эфирное - 1.05 мг, масло сассафры эфирное - 8.4 мг, левоментол - 17.55 мг, натрия сахарината моногидрат - 20.36 мг, лимонной кислоты моногидрат - 45 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) - 15 мг, полисорбат 60 - 700 мг, этанол 96% - 4 г, вода очищенная - до 100 мл.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным колпачком - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик для местного применения в стоматологии и ЛОР-практике. Обладает также противогрибковой активностью и анальгезирующим действием при нанесении на слизистую оболочку. Кроме того, Стопангин оказывает обволакивающее действие.

Длительность действия - 10-12 ч.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Стопангин не предоставлены.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани (тонзиллит, в т.ч. ангина Венсана, фарингит, стоматит, афтозные язвы полости рта, глоссит, периодонтит, кровоточивость десен);

— грибковые заболевания (кандидоз) полости рта и гортани до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани;

— травмы полости рта и гортани;

— профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба;

— гигиена полости рта для устранения неприятного запаха изо рта (дезодорирующее средство);

— профилактика суперинфекции при разрушающих опухолях полости рта и гортани.

Относится к болезням:

- Альвеолит
- Грибковые заболевания
- Инфекции
- Опухоли
- Стоматит
- Тонзиллит
- Травмы
- Фарингит

Противопоказания:

— атрофический фарингит;

— детский возраст до 6 лет;

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Раствор применяют неразбавленным для полоскания полости рта - 10-15 мл (1 десертная или столовая ложка) в течение не менее 30 сек 2 раза/сут. Можно также смазывать слизистую оболочку полости рта с помощью ватного тампона на палочке. Этот способ применения целесообразно использовать у детей.

Раствор следует применять после еды или в промежутках между приемами пищи.

Длительность лечения препаратом Стопангин составляет 5-7 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно ощущение жжения слизистой оболочки полости рта (быстро самопроизвольно проходит).

Прочие: в исключительных случаях у пациентов с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции; при случайном проглатывании препарата при полоскании возможна тошнота (проходит самопроизвольно).

В случае появления необычных реакций пациент должен посоветоваться с врачом о целесообразность дальнейшего применения препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препаратом неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Стопангин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациента следует предупредить о необходимости консультации врача в следующих случаях: при появлении необычных реакций при применении препарата; при ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, неэффективности проведения лечебных процедур; при необходимости одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами; при передозировке.

Целесообразность одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами определяет врач.

Раствор для местного применения содержит 4% этанола.

Использование в педиатрии

Стопангин в форме раствора для местного применения можно назначать детям с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого проглатывания препарата.

Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, принимающим Стопангин, в течение 30 мин после его применения следует воздерживаться от вождения автотранспорта.

Применение в детском возрасте

Препарат Стопангин в форме раствора для местного применения можно назначать детям с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого проглатывания препарата. Не рекомендуется прием препарата у детей до 6 лет.

Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, следует обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°С; не замораживать.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stopangin