

Стопангин 2А



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания апельсиновые** розовато-оранжевого цвета с вкраплениями, круглые, с фаской; на одной стороне гравировка: "RAFA" и изображение зонтика; с апельсиновым запахом.

	1 таб.
бензокаин	2 мг
тиротрицин	1 мг

Вспомогательные вещества: ксилитол - 698.29 мг, повидон К25 - 1.93 мг, повидон К90 - 5 мг, магния стеарат - 10.6 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) - 0.83 мг, ароматизатор апельсиновый - 0.1 мг.

12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания лимонные** желтого цвета с вкраплениями, круглые, с фаской; на одной стороне гравировка: "RAFA" и изображение зонтика; с лимонным запахом.

	1 таб.
бензокаин	2 мг
тиротрицин	1 мг

Вспомогательные вещества: ксилитол - 698.29 мг, повидон К90 - 7 мг, магния стеарат - 10 мг, краситель хинолиновый желтый (E104) - 0.83 мг, ароматизатор лимонный - 14.2 мг.

12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания клубничные** розово-малинового цвета с вкраплениями, круглые, с фаской; на одной стороне гравировка: "RAFA" и изображение зонтика; с клубничным запахом.

	1 таб.
бензокаин	2 мг
тиротрицин	1 мг

Вспомогательные вещества: ксилитол - 690.61 мг, повидон К90 - 7 мг, магния стеарат - 10 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) (E124) - 7.17 мг, вкусовая добавка клубничная - 1.97 мг.

12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания мятные** зеленого цвета с вкраплениями, круглые, с фаской; на одной стороне гравировка: "RAFA" и изображение зонтика; с мятным запахом.

	1 таб.
бензокаин	2 мг
тиротрицин	1 мг

Вспомогательные вещества: ксилитол - 679.85 мг, повидон К90 - 7 мг, магния стеарат - 14.17 мг, краситель зеленый (E142) - 14.3 мг, ароматизатор мяты перечной - 1.43 мг.

12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает противомикробное и местноанестезирующее действие. Уменьшает раздражение и боль в горле, а также отек слизистой оболочки полости рта.

Бензокаин - местный анестетик для поверхностной анестезии. Уменьшает проницаемость клеточной мембраны для натрия, вытесняет кальций из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, блокирует проведение нервных импульсов. При нанесении на поверхность слизистой оболочки полости рта действие развивается через 1 мин.

Тиротрицин - антибиотик, получаемый из бактерий вида *Bacillus brevis*; это смесь циклических и линейных (алифатических) полипептидов. Смесь содержит до 70-80% тироцидина (щелочной циклический декапептид) и 20-30% грамицидина (нейтральный линейный пента-декапептид). Активен в отношении широкого спектра грамположительных микроорганизмов и спирохет полости рта.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Стопангин 2А не предоставлены.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани (симптоматическая терапия).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не применять пациентам обоего пола при планировании беременности.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 таб. каждые 2-3 ч. Продолжительность лечения - не более 5 дней.

Таблетку необходимо медленно рассасывать во рту.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможно - контактный дерматит, кожная сыпь.

Местные реакции: возможно - стойкое снижение чувствительности слизистой оболочки полости рта, отек слизистой оболочки полости рта или глотки.

При появлении указанных симптомов пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Симптомы: цианоз, диспноэ, головокружение.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Стопангин 2А противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бензокаин за счет образования своего метаболита 4-аминобензойной кислоты снижает антибактериальную активность сульфаниламидов и аminosалицилатов.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии эффекта в течение двух дней необходимо обратиться к врачу.

Стопангин 2А не содержит сахара, поэтому препарат можно применять у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stopangin_2A