

[Стопангин 2А Форте](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** (медово-лимонные).

	1 таб.
бензокаин	3.675 мг
гиротрицин	2.1 мг

12 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и местноанестезирующее действие. Уменьшает раздражение и боль в горле, а также отек слизистой оболочки полости рта.

Бензокаин местный анестетик для поверхностной анестезии. Уменьшает проницаемость клеточной мембраны для натрия, вытесняет кальций из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, блокирует проведение нервных импульсов. При нанесении на поверхность слизистой оболочки полости рта действие развивается через 1 мин.

Тиротрицин - антибиотик, получаемый из бактерий вида *Bacillus brevis*; это смесь циклических и линейных (алифатических) полипептидов. Смесь содержит до 70-80% тироцидина (щелочной циклический декапептид) и 20-30% грамицидина (нейтральный линейный пента-декапептид). Активен в отношении широкого спектра грамположительных микроорганизмов и спирохет полости рта.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла с выраженным болевым синдромом (симптоматическая терапия).

Относится к болезням:

- [Болевой синдром](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 18 лет;
- период беременности и лактации;
- гиперчувствительность к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Не применять пациентам обоего пола при планировании беременности.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке каждые 2-3 ч. Таблетку необходимо медленно рассасывать во рту. Продолжительность лечения не должна превышать 5 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, контактный дерматит, стойкое снижение чувствительности слизистой оболочки полости рта. Кожная сыпь, отек слизистой оболочки полости рта или глотки. При появлении указанных симптомов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Симптомы: цианоз, диспноэ, головокружение.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бензокаин за счет образования своего метаболита 4-аминобензойной кислоты снижает антибактериальную активность сульфаниламидов и аminosалицилатов.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии эффекта в течение двух дней необходимо обратиться к врачу. Препарат не содержит сахара, поэтому он может использоваться у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом.

Влияние препарата на способность управлять транспортным средством или на работу с механизмами

Нет сведений.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Стопангин 2А Форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stopangin_2A_Forte