Стопангин (спрей)



Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гексэтидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей для местного применения 0.2%*** в виде прозрачной, бесцветной или почти бесцветной жидкости со специфическим запахом.

	30 мл
гексэтидин	57.7 мг

Вспомогательные вещества: метилсалицилат - 6.7 мг, масло анисовое эфирное - 14 мг, масло эвкалиптовое эфирное - 4 мг, масло цветов апельсина эфирное - 3.3 мг, масло сассафры эфирное - 3.3 мг, эфирное масло мяты перечной - 23.1 мг, левоментол - 6.7 мг, натрия сахарината моногидрат - 8.3 мг, глицерол 85% - 7.6598 г, этанол 96% - 19.3877 г.

30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с распылителем и аппликатором - коробки картонные.
30 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) с распылителем и аппликатором - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик для местного применения в стоматологии и ЛОР-практике. Обладает также противогрибковой активностью и анальгезирующим действием при нанесении на слизистую оболочку. Кроме того, Стопангин оказывает обволакивающее действие.

Длительность действия - 10-12 ч.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Стопангин не предоставлены.

Показания к применению:

— инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани (тонзиллит, в т.ч. ангина Венсана, фарингит, стоматит, афтозные язвы полости рта, глоссит, периодонтит, кровоточивость десен);

— грибковые заболевания (кандидоз) полости рта и гортани до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани;

— травмы полости рта и гортани;

— профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба;

— гигиена полости рта для устранения неприятного запаха изо рта (дезодорирующее средство);

— профилактика суперинфекции при разрушающих опухолях полости рта и гортани.

Относится к болезням:

- Альвеолит
- Грибковые заболевания
- Инфекции
- Опухоли
- Стоматит
- Тонзиллит
- Травмы
- Фарингит

Противопоказания:

— атрофический фарингит;

— детский возраст до 8 лет;

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Спрей применяют 2 раза/сут (если врач не назначил иначе), после приема пищи или в промежутках между приемами пищи.

Перед использованием снять с флакона защитный колпачок и присоединить аппликатор. Нажать 2-3 раза для того, чтобы раствор поступил в распылитель. Затем задержать дыхание и прыснуть на пораженный участок. После использования аппликатор следует ополоснуть теплой водой.

Длительность лечения препаратом Стопангин составляет 5-7 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: ощущение жжения слизистой оболочки полости рта (быстро самопроизвольно проходит).

Прочие: в исключительных случаях у пациентов с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции; при случайном проглатывании препарата при полоскании возможна тошнота (проходит самопроизвольно).

Передозировка:

Случаи передозировки препаратом неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Стопангин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациента следует предупредить о необходимости консультации врача в следующих случаях: при появлении необычных реакций при применении препарата; при ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, неэффективности проведения лечебных процедур; при необходимости одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами; при передозировке.

Спрей не следует вдыхать, необходимо избегать его попадания в глаза.

Целесообразность одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами определяет врач.

Без консультации с врачом препарат можно применять не дольше 5-7 дней.

Использование в педиатрии

Стопангин в форме спрея можно назначать только **детям старше 8 лет** и лишь в тех случаях, когда возможно правильное применение препарата (ребенок не сопротивляется аппликатору, находящемуся во рту, и должен уметь задерживать дыхание в момент впрыскивания спрея).

Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, следует обратиться к врачу.

Препарат содержит 62% этанола.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, принимающим Стопангин, в течение 30 мин после его применения следует воздерживаться от вождения автотранспорта.

Применение в детском возрасте

Препарат Стопангин в форме спрея можно назначать только **детям старше 8 лет** и лишь в тех случаях, когда возможно правильное применение препарата (ребенок не сопротивляется аппликатору, находящемуся во рту, и должен уметь задерживать дыхание в момент впрыскивания спрея). Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, следует обратиться к врачу.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°C; не замораживать.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stopangin_sprey