

## Стопангин (спрей)



### Код АТХ:

- [R02AA20](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гексэтидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей для местного применения 0.2%** в виде прозрачной, бесцветной или почти бесцветной жидкости со специфическим запахом.

	<b>30 мл</b>
гексэтидин	57.7 мг

*Вспомогательные вещества:* метилсалицилат - 6.7 мг, масло анисовое эфирное - 14 мг, масло эвкалиптовое эфирное - 4 мг, масло цветов апельсина эфирное - 3.3 мг, масло сассафры эфирное - 3.3 мг, эфирное масло мяты перечной - 23.1 мг, левоментол - 6.7 мг, натрия сахарината моногидрат - 8.3 мг, глицерол 85% - 7.6598 г, этанол 96% - 19.3877 г.

30 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с распылителем и аппликатором - коробки картонные.

30 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) с распылителем и аппликатором - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антисептик для местного применения в стоматологии и ЛОР-практике. Обладает также противогрибковой активностью и анальгезирующим действием при нанесении на слизистую оболочку. Кроме того, Стопангин оказывает обволакивающее действие.

Длительность действия - 10-12 ч.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Стопангин не предоставлены.

## Показания к применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани (тонзиллит, в т.ч. ангина Венсана, фарингит, стоматит, афтозные язвы полости рта, глоссит, периодонтит, кровоточивость десен);
- грибковые заболевания (кандидоз) полости рта и гортани до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани;
- травмы полости рта и гортани;
- профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба;
- гигиена полости рта для устранения неприятного запаха изо рта (дезодорирующее средство);
- профилактика суперинфекции при разрушающих опухолях полости рта и гортани.

## Относится к болезням:

- [Альвеолит](#)
- [Грибковые заболевания](#)
- [Инфекции](#)
- [Опухоли](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Фарингит](#)

## Противопоказания:

- атрофический фарингит;
- детский возраст до 8 лет;
- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Спрей применяют 2 раза/сут (если врач не назначил иначе), после приема пищи или в промежутках между приемами пищи.

Перед использованием снять с флакона защитный колпачок и присоединить аппликатор. Нажать 2-3 раза для того, чтобы раствор поступил в распылитель. Затем задержать дыхание и прыснуть на пораженный участок. После использования аппликатор следует ополоснуть теплой водой.

Длительность лечения препаратом Стопангин составляет 5-7 дней.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* ощущение жжения слизистой оболочки полости рта (быстро самопроизвольно проходит).

*Прочие:* в исключительных случаях у пациентов с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции; при случайном проглатывании препарата при полоскании возможна тошнота (проходит самопроизвольно).

## Передозировка:

Случаи передозировки препаратом неизвестны.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Стопангин не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациента следует предупредить о необходимости консультации врача в следующих случаях: при появлении необычных реакций при применении препарата; при ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, неэффективности проведения лечебных процедур; при необходимости одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами; при передозировке.

Спрей не следует вдыхать, необходимо избегать его попадания в глаза.

Целесообразность одновременного применения препарата Стопангин с другими лекарственными средствами определяет врач.

Без консультации с врачом препарат можно применять не дольше 5-7 дней.

### *Использование в педиатрии*

Стопангин в форме спрея можно назначать только **детям старше 8 лет** и лишь в тех случаях, когда возможно правильное применение препарата (ребенок не сопротивляется аппликатору, находящемуся во рту, и должен уметь задерживать дыхание в момент впрыскивания спрея).

Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, следует обратиться к врачу.

Препарат содержит 62% этанола.

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Пациентам, принимающим Стопангин, в течение 30 мин после его применения следует воздерживаться от вождения автотранспорта.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат Стопангин в форме спрея можно назначать только **детям старше 8 лет** и лишь в тех случаях, когда возможно правильное применение препарата (ребенок не сопротивляется аппликатору, находящемуся во рту, и должен уметь задерживать дыхание в момент впрыскивания спрея). Следует предупредить родителей о том, что если ребенок случайно принял препарат внутрь, следует обратиться к врачу.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°C; не замораживать.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Stopangin\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Stopangin_sprey)