

Стопдиар



Код АТХ:

- [A07AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифуросазид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
нифуросазид	100 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил гидрофильный 200) - 3 мг, крахмал картофельный - 179 мг, желатин - 11 мг, тальк - 6 мг, магния стеарат - 1 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 3 мг, титана диоксид - 0.252 мг, тальк - 0.062 мг, полиэтиленгликоль 20 000 - 0.201 мг, краситель хинолиновый желтый - 0.112 мг.

24 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противодиарейный препарат. Нифуроксазид - производное нитрофурана, оказывает антибактериальное действие в отношении желудочно-кишечных *грамположительных бактерий* *Staphylococcus* spp. и некоторых *грамотрицательных бактерий* - *Yersinia* spp., *Escherichia* spp., *Citobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Salmonella* spp.

Нифуроксазид не оказывает антибактериального действия на бактерии *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella* spp. и *Pseudomonas aeruginosa*.

Не влияет на состав нормальной бактериальной флоры пищеварительного тракта.

Подробный механизм действия препарата неизвестен.

Нифуроксазид предположительно тормозит активность дегидрогеназ и синтез белков в клетках бактерий. Не вызывает возникновения лекарственно-устойчивых штаммов, не наблюдалась также перекрестная устойчивость к другим противобактериальным препаратам.

Эффективность действия нифуроксазида не зависит ни от pH, существующего в просвете кишечника, ни от чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Препарат практически не всасывается из пищеварительного тракта, действует исключительно в просвете кишечника.

Фармакокинетика

Нифуроксазид труднорастворим. После приема внутрь практически не всасывается из ЖКТ и не обладает системным эффектом. Выводится через кишечник.

Показания к применению:

— острая и хроническая диарея бактериального происхождения.

Противопоказания:

— детский возраст до 7 лет;

— повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана или любому вспомогательному веществу.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь.

Взрослым и детям старше 7 лет назначают по 2 таб. (200 мг) 4 раза/сут через 6 ч. Курс лечения - 3 дня. Если после этого срока симптомы не исчезнут, пациент должен обратиться к врачу.

Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, не измельчая, запивая соответствующим количеством воды.

Побочное действие:

Нифуроксазид хорошо переносится, побочные эффекты практически не наблюдались.

При наличии повышенной индивидуальной чувствительности к нифуроксазиду в единичных случаях возможны следующие побочные реакции.

Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, усиление диареи.

Со стороны системы кроветворения: гранулоцитопения.

Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: кожная сыпь (в т.ч. пустулезная), узелковая почесуха.

Аллергические реакции: одышка, отек лица, губ, языка, кожная сыпь, зуд.

Передозировка:

До настоящего времени данные о передозировке препарата не поступали.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) препарат применяют только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во время лечения нифуроксазидом следует избегать одновременного приема других лекарственных препаратов для приема внутрь из-за выраженных адсорбционных свойств нифуроксазида.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения необходимо перорально или парентерально (в зависимости от состояния больного) восполнять потерю жидкости.

В случае появления реакции гиперчувствительности (одышка, отек лица, губ, языка, кожная сыпь, зуд) следует немедленно прекратить прием препарата.

Употребление алкоголя во время лечения нифуроксазидом может вызвать дисульфирамоподобную реакцию.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению автомобилем и работе с другими механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 7 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Stopdiar>