Стоптуссин-Фито

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** густой, коричневого цвета, с тимьяновым запахом.

	100 г
жидкий экстракт тимьяна	4.1666 г
жидкий экстракт чабреца	4.1666 г
жидкий экстракт подорожника	4.1666 г

Вспомогательные вещества: мед очищенный, натрия бензоат, пропилпарабен, сахароза, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным колпачком - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отхаркивающий препарат растительного происхождения. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие, способствует снижению вязкости мокроты.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Стоптуссин-Фито не предоставлены.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой:

— трахеит;

— бронхит;

— трахеобронхит.

Относится к болезням:

- Бронхит

- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— декомпенсация сердечной деятельности;

— заболевания печени;

— заболевания почек;

— врожденная непереносимость фруктозы;

— нарушение усвоения глюкозы и галактозы;

— недостаток фермента, расщепляющего сахарозу и изомальтозу;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст до 1 года;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* (вследствие наличия этанола в препарате) следует применять препарат у пациентов с алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями и травмами головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым и детям старше 15 лет - по 1 столовой ложке 3-5 раз/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет - по 1/2-1 чайной ложке 2-3 раза/сут, **от 5 до 10 лет** - по 1-2 чайные ложки 3 раза/сут, **от 10 до 15 лет** - по 2-3 чайные ложки 3 раза/сут.

Средний курс лечения - 7 дней. Увеличение продолжительности лечения и проведение повторных курсов возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Стоптуссин-Фито не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Стоптуссин-Фито не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит 3.4 об.% этанола; 1 чайная ложка (5 мл) содержит до 0.14 г этанола; 1 столовая ложка (15 мл) -

до 0.41 г этанола.

В составе препарата содержится 62% сахарозы, поэтому его следует с осторожностью применять у пациентов с сахарным диабетом и у лиц, находящихся на диете с пониженным содержанием углеводов. В 1 чайной ложке препарата содержится до 3.1 г сахарозы, в 1 столовой ложке - до 9.3 г сахарозы.

Использование в педиатрии

Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола).

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Препарат противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 1 года. Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Stoptussin-Fito